

2. 野独活族——Trib. *Miliuscae* Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 147. 1855

叶被柔毛或无毛。花瓣2轮, 6片, 每轮3片, 全部为镊合状排列, 外轮花瓣比内轮花瓣小, 与萼片不易区别; 雄蕊疏覆瓦状排列, 药隔截形或尖。

约12属, 我国有5属, 11种, 分布于西南和华南。

3. 亮花木属* ——*Phaeanthus* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 146. 1855; R. E. Fries
in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 140.
1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 87. 1967.

乔木、灌木或攀援灌木(外国种)。叶互生; 羽状脉; 有叶柄。花单生于枝顶或为腋上生的簇生花序; 萼片3, 小, 镊合状排列; 花瓣6片, 2轮, 每轮3片, 镊合状排列, 外轮的小, 似萼片, 内轮的大, 扁平, 通常革质; 雄蕊多数, 药隔顶端膨大, 截形或平头状; 心皮多数, 花柱长圆形, 柱头头状, 每心皮有胚珠1—2颗, 少数为5—8颗。成熟心皮椭圆状或圆球状或圆柱状, 内通常有种子1颗; 果有柄。

约20种, 分布于亚洲南部及东南部。我国产1种, 产于云南。

本属模式种为: *Phaeanthus nutans* (Wall.) Hook. f. et Thoms.

1. 囊瓣亮花木(中国种子植物名称)

Phaeanthus saccopetaloides W. T. Wang, 植物分类学报 6: 198. 1957.

乔木, 高约6米; 小枝和叶柄被紧贴的锈色柔毛, 老枝无毛, 有皮孔。叶膜质, 长圆形或椭圆形, 或卵状长圆形, 有时圆形, 长5.5—13.5厘米, 宽2—4.5厘米, 叶面除中脉被微毛外无毛, 叶背绿色, 被极稀疏短柔毛, 老渐无毛; 侧脉每边7—11条, 下面稍凸起, 网脉稀疏; 叶柄长3.5—5毫米, 上面有槽。花绿黄色, 单朵与叶对生; 花梗长2.2厘米, 被疏微毛; 苞片极小, 披针形; 萼片三角状卵形, 长和宽约1毫米, 外面被锈色柔毛, 内面无毛; 外轮花瓣小, 三角状卵形, 长约4毫米, 内轮花瓣大, 卵状长圆形或阔披针形, 长27—35毫米, 宽10—13毫米, 外面被短柔毛, 内面被毛更密; 药隔顶端截形; 心皮约12个, 长约2.2毫米, 密被淡黄色绒毛, 柱头圆球状, 无柄; 每心皮有胚珠约8颗, 2排。果倒卵状椭圆形至长圆状线形, 长1.8—2.7厘米, 直径1—1.2厘米, 有时有1—3缢缩; 果柄长4—6毫米。花期8月, 果期翌年6月。

* 亮花木属(中国种子植物科属辞典)。

产于云南西南部。生于海拔 1800—2300 米山地林中。本种模式标本采自镇康。

4. 蚁花属* —— *Mezzettiopsis* Ridl.

Ridl. in Kew Bull. 1912: 389. 1912.

乔木。叶互生；羽状脉；有短叶柄。花小，集成腋生的密伞花序，被粗毛；花萼裂片 3，小，卵形，基部合生；花瓣 6 片，2 轮，有透明腺点，外轮比内轮短，与萼片相似，卵形或阔卵形，内轮花瓣厚而长，镰刀状，中部以下渐狭，顶端外卷，基部无爪而内弯成穹窿状并覆盖着雌雄蕊；雄蕊多数，椭圆形，药室阔，毗连，外向，药隔顶端有尖头；心皮多数，离生，长卵形，柱头圆球状，每心皮有胚珠 1—4 颗，基生或侧膜胎座着生。成熟心皮多数，圆球状，有果柄。

约 1 种，分布于我国和印度尼西亚。

本属模式种为：*Mezzettiopsis creaghii* Ridl.

R. E. Fries (in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2: 130. 1959) 和 J. Hutchinson (Gen. Fl. Pl. 1: 88. 1967) 都将本属归并入澄广花属 (*Orophea* Bl.) 中。我们认为两个属是不同的，因为它们的主要特征有显著的区别：本属的内轮花瓣厚而长，镰刀状，顶端向外卷，基部无爪而内弯成穹窿状并覆盖着雌雄蕊；而澄广花属的内轮花瓣上部阔三角形，边缘粘合成一帽状体，基部有爪。因此本志仍留用此属名。

1. 蚁花(中国植物学杂志) 图版 12

Mezzettiopsis creaghii Ridl. in Kew Bull. 1912: 389. 1912; Sarawak in Mus. Journ. 1 (3): 97. 1913; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 5. 1935; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 683, 图 2. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 326. 1937; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 255, 图 127. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 812, 图 1623. 1972. —— *Orophea palawanensis* Elm. Leaf. Philip. Bot. 5: 1721. 1913. —— *O. polycarpa* sensu Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 232. 1935, non A. DC.

乔木，高达 12 米；枝条灰黑色。叶近革质，椭圆形至长圆形，长 9—15 厘米，宽 3—6 厘米，顶端短渐尖或钝，基部阔楔形或钝，两面无毛，或仅叶背中脉上被疏粗毛；侧脉每边 7—10 条，在上面扁平，下面凸起。花直径 3—5 毫米；花梗、苞片、萼片及外

* 蚁花属(中国植物学杂志)。