

疏;药隔稍凸出;心皮4—8个,长圆形,柱头圆球状,无毛,每心皮有胚珠1颗,基生。果圆球状,直径约7毫米,无毛,有疏瘤点,内有种子1颗;果柄纤细,长9—21毫米,无毛;总果柄长1.7—3.5厘米。花期5月,果期6月。

产于云南南部。生于海拔1500米山地阔叶林中或山谷灌木丛中。本种模式标本采自澜沧。

3. 野独活(广西) 密榴木(植物学名词审查本); 细梗密榴木(中国植物学杂志); 算盘子密榴木(广西植物名录) 图版16: 9—12

Milusa chunii W. T. Wang, 植物分类学报 6: 202. 1957; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 255, 图128. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 812, 图1624. 1972. —*M. filipes* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 223, fig. 22. 1935; 蒋英, 中国植物学杂志 2(3): 684, 图3. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 327. 1937, non Ridl. in Journ. Fed. Mal. States Mus. 10: 81. 1920.

灌木,高2—5米;小枝稍被伏贴短柔毛。叶膜质,椭圆形或椭圆状长圆形,长7—15厘米,宽2.5—4.5厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部宽楔形或圆形,偏斜,无毛或中脉两面及叶背侧脉被疏微柔毛,后变无毛;侧脉每边10—12条,纤细,顶端弯拱而在叶缘前联结;叶柄长2—3毫米,被疏微毛至无毛。花红色,单生于叶腋内,直径1.3—1.6厘米;花梗细长,丝状,长4—6.5厘米,无毛;萼片卵形,长约2毫米,边缘及外面稍被短柔毛;外轮花瓣比萼片略长些,内轮花瓣卵圆形,长达1.8厘米,宽8—12毫米;雄蕊倒卵形,花丝短,无毛;心皮弯月形,稍被紧贴柔毛,柱头圆柱状,稍外弯,被微毛,顶端全缘,每心皮有胚珠2—3颗。果圆球状,直径7—8毫米,内有种子1—3颗,在种子间有时缢缩;果柄纤细,长1—2厘米;总果柄柔弱,基部细,向顶端增粗,长4—7.5厘米,无毛,有小瘤体。花期4—7月,果期7月—翌年春季。


产于广东、广西和云南。生于山地密林中或山谷灌木林中。越南也有。本种模式标本采自广东海南岛崖县。

7. 囊瓣木属* ——*Saccopetalum* Benn.

Benn. Pl. Jav. Rar. 165, tab. 35. 1838.

乔木。叶互生;羽状脉;有叶柄。花腋生,单朵或数朵簇生;萼片3,小,镊合状排列;花瓣6片,2轮,镊合状排列,外轮花瓣小,萼片状,内轮花瓣甚大,分离,直立或稍

* 囊瓣木属(植物分类学报)。



1—8. 中华野独活 *Miliusa sinensis* Finet et Gagnep., 1. 花枝; 2. 花; 3. 内轮花瓣的内面观; 4. 雄蕊的腹面观; 5. 雄蕊的背面观; 6—7. 心皮和心皮的纵切面, 示胚珠的着生; 8. 果枝。9—12. 野独活 *Miliusa chunii* W. T. Wang, 9. 叶枝; 10. 除去内轮花瓣的花; 11—12. 心皮和心皮的纵切面, 示胚珠着生。13—15. 云南野独活 *Miliusa tenuitipitata* W. T. Wang, 13. 花; 14. 雌蕊群和花托; 15. 果枝。(陈国泽绘)