

柔毛,内有种子1—2颗;果柄长8—10毫米,被柔毛。花期10月,果期翌年8月。

产于云南西南部。生于海拔1000—1400米山地密林中。本种模式标本采自景洪。

N. T. Ban 根据本种的子房内有胚珠2—5颗和果实念珠状的特征,从 *Phaeanthus* 属中迁移到皂帽花属 *Dasymaschalon* 中来,但他声明说没有看见花的模式标本。我们有本种的花模式标本和果实模式标本。根据模式标本上的花解剖,本种的花瓣是张开的,6片,2轮,每轮3片,外轮花瓣虽然较小(长3毫米),但都比萼片大(萼片长1毫米),胚珠2—5颗和果实念珠状,这些特征完全符合假鹰爪属 *Desmos*。而皂帽花属的花瓣3片,1轮,边缘粘合呈尖帽状,与本种特征完全不相符合。因此,我们将本种组合如上。

9. 蒙蒿子属* —— *Anaxagorea* St. Hil.

St. Hil. in Bull. Soc. Philom. Paris 91. 1825; R. E,
Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2:
117. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 102. 1967.

乔木或灌木。叶互生;羽状脉;有叶柄。花单生或几朵丛生;花梗短;花萼裂片3,镊合状排列,基部合生;花瓣6片,2轮,每轮3片,镊合状排列,内外轮花瓣近等大,或外轮比内轮大些,薄膜质;雄蕊多数,线形,药隔顶端短尖,突出于药室外而成为一顶生的附属体;心皮少数至多数,每心皮有胚珠2颗,基生,直立,柱头近圆球状或长圆状。成熟心皮蓇葖状,开裂,有棒状的柄,内有种子1—2颗;种子无假种皮,种皮有光泽。

约30种,分布于亚洲热带地区和美洲。我国产1种,产于广东(海南)和广西。

本属模式种为: *Anaxagorea acuminata* (Dun.) St. Hil.

1. 蒙蒿子(中国植物学杂志) 长柄灯台树(海南保亭) 图版21

Anaxagorea luzonensis A. Gray, Bot. Wilkes U. S. Explor. Esped. 27. 1854; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 68. 1872; King in Ann. Bot. Gard. Calc. 4: 84, Pl. 118A. 1893; Finet et Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 76, fig. 10 (1—3). 1907; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 277. 1928; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 80. 1938; 蒋英,

* 蒙蒿子属(中国植物学杂志)。



蒙蒿子 *Anaxagorea luzonensis* A. Gray, 1. 果枝; 2. 种子。(陈国泽绘)

中国植物学杂志 2 (3): 704, 图 14. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 324, 图 244. 1937; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 239, 图 116. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 806, 图 1611. 1972.

直立灌木, 高 1—2 米, 全株无毛。叶膜质, 长圆形至阔椭圆形, 长 9—16 厘米, 宽 3—7 厘米, 顶端急尖或钝, 基部近圆形, 干时灰黄色; 侧脉每边 7—8 条, 纤细, 上面扁平, 下面凸起, 网脉疏距; 叶柄长 6—20 毫米。花小, 1—2 朵与叶对生, 淡绿色, 长约 12 毫米; 花梗长约 6 毫米; 萼片圆形, 外面被毛; 外轮花瓣比内轮花瓣稍长, 卵形, 钝头, 薄膜质, 宽为内轮的 2 倍; 心皮 2—4 个, 卵状长圆形, 被微柔毛, 每心皮有胚珠 2 颗。果蓇葖状, 腹缝线开裂, 有棒状的柄, 长 2—2.5 厘米, 直径 5—7 毫米, 顶端凸尖; 种子 1—2 颗, 扁, 倒卵形, 长 8 毫米, 宽约 6 毫米, 初时红色, 成熟时黑褐色而有光泽。

果期 10 月—翌年 1 月。

产于广东海南岛和广西。生于中海拔山地密林中。印度、斯里兰卡、泰国、老挝、柬埔寨、越南、菲律宾和印度尼西亚等地也有。本种模式标本采自菲律宾的吕宋岛。

10. 银钩花属* ——*Mitrephora* (Bl.) Hook. f. et Thoms.

(Bl.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 112. 1855; R. E.

Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a,

2: 136. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 98. 1967.——*Uvaria*

Linn. sect. *Mitrephora* Bl. Fl. Jav. Anon. 13. 1829.

乔木。叶互生; 羽状脉。花单生或几朵集成总状花序, 腋生或与叶对生, 通常两性花, 有时单性花; 萼片 3, 圆形或宽卵形; 花瓣 6 片, 2 轮, 镊合状排列, 外轮花瓣大于内轮花瓣, 外轮花瓣卵形或倒卵形, 薄膜质, 有脉纹, 内轮花瓣箭头形或铁铲形, 基部有长爪, 上部卵形或披针形, 向内弯拱而边缘稍粘合呈圆球状; 雄蕊多数, 长圆状楔形, 药室外向, 分离, 药隔顶端截形; 心皮通常多数, 长圆形, 花柱长圆形或棒状, 少数花柱极短或不明显, 腹部有槽纹, 每心皮有胚珠 4 至多颗, 2 排。成熟心皮圆球状或卵圆状, 有时长圆状椭圆形, 有柄或近无柄。

约 40 种, 分布于亚洲南部和东南部的热带和亚热带地区至大洋洲。我国产 3 种, 分布于西南和华南。

本属模式种为 *Mitrephora obtusa* (Bl.) Hook. f. et Thoms.

* 银钩花属(中国植物学杂志)。