

柔毛,内有种子1—2颗;果柄长8—10毫米,被柔毛。花期10月,果期翌年8月。

产于云南西南部。生于海拔1000—1400米山地密林中。本种模式标本采自景洪。

N. T. Ban 根据本种的子房内有胚珠2—5颗和果实念珠状的特征,从 *Phaeanthus* 属中迁移到皂帽花属 *Dasymaschalon* 中来,但他声明说没有看见花的模式标本。我们有本种的花模式标本和果实模式标本。根据模式标本上的花解剖,本种的花瓣是张开的,6片,2轮,每轮3片,外轮花瓣虽然较小(长3毫米),但都比萼片大(萼片长1毫米),胚珠2—5颗和果实念珠状,这些特征完全符合假鹰爪属 *Desmos*。而皂帽花属的花瓣3片,1轮,边缘粘合呈尖帽状,与本种特征完全不相符合。因此,我们将本种组合如上。

9. 蒙蒿子属* —— *Anaxagorea* St. Hil.

St. Hil. in Bull. Soc. Philom. Paris 91. 1825; R. E,
Fries in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 17a, 2:
117. 1959; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 102. 1967.

乔木或灌木。叶互生;羽状脉;有叶柄。花单生或几朵丛生;花梗短;花萼裂片3,镊合状排列,基部合生;花瓣6片,2轮,每轮3片,镊合状排列,内外轮花瓣近等大,或外轮比内轮大些,薄膜质;雄蕊多数,线形,药隔顶端短尖,突出于药室外而成为一顶生的附属体;心皮少数至多数,每心皮有胚珠2颗,基生,直立,柱头近圆球状或长圆状。成熟心皮蓇葖状,开裂,有棒状的柄,内有种子1—2颗;种子无假种皮,种皮有光泽。

约30种,分布于亚洲热带地区和美洲。我国产1种,产于广东(海南)和广西。

本属模式种为: *Anaxagorea acuminata* (Dun.) St. Hil.

1. 蒙蒿子(中国植物学杂志) 长柄灯台树(海南保亭) 图版21

Anaxagorea luzonensis A. Gray, Bot. Wilkes U. S. Explor. Esped. 27. 1854; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 68. 1872; King in Ann. Bot. Gard. Calc. 4: 84, Pl. 118A. 1893; Finet et Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 76, fig. 10 (1—3). 1907; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 277. 1928; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 80. 1938; 蒋英,

* 蒙蒿子属(中国植物学杂志)。