

圆形或卵圆形,有时长圆状椭圆形,长4.5—11.5厘米,宽2—4.5厘米,顶端短渐尖或急尖,基部圆形,除中脉外两面均无毛;中脉上面凹陷,下面凸起,两面均被微毛或后变无毛,侧脉每边10—13条,上面扁平,下面凸起;叶柄长3—4毫米,被微毛或几无毛,有横纹。花1—2朵,腋上生;总花梗长约6毫米,着生有小苞片11—12个;花梗长约1厘米;萼片三角形,外面被短柔毛,内面无毛;花瓣卵状三角形,外面被短柔毛,内面无毛,内轮花瓣比外轮花瓣稍小;雄蕊卵圆形,药隔顶端急尖;心皮1—5个,卵状长圆形,被柔毛,内有胚珠10颗,2排,柱头近圆球状,顶端2裂,无毛。果1—5个聚生于总果柄上,卵圆状或近圆球状,长达2.5厘米,直径达2厘米,密被短柔毛;总果柄长约1.3厘米,有宿存的小苞片7—8个。 果期6月。

产于广西西部和云南西南部。生于海拔2280米山地沟谷林中。越南也有。 本种模式标本采自越南河内。


3. 金平藤春(植物分类学报) 图版 50

Alphonsea boniana Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Francé 53, Mém. 4: 162. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 122, Pl. IIC (C', 17—21). 1907; 李秉滔,植物分类学报 14(1): 111. 1976.——*A. tonquiensis* sensu C. Y. Wu et W. T. Wang, 植物分类学报 6: 210. 1957, non A. DC.

灌木,高约2米;嫩枝被微毛,老渐无毛。叶椭圆形至长圆状椭圆形,长5—11厘米,宽1.4—3厘米,顶端短渐尖或渐尖,基部阔楔形,叶面亮绿色,无毛,叶背浅绿色,仅中脉上初时被微毛,后变无毛;侧脉每边10—13条,纤细,上面扁平,下面稍凸起;叶柄长3毫米,无毛或初时被疏微毛,有横纹。花序与叶对生或腋上生,有花2朵,有时1朵凋落;总花梗长2—3毫米,无毛,着生有小苞片4—5个;花梗长4—7毫米,被微毛,中部和基部有小苞片数个;萼片阔卵状肾形,长1毫米,宽2毫米,顶端圆形,外面被微毛,内面无毛;外轮花瓣卵状披针形,长达7毫米,宽达4毫米,基部内弯,外面密被黄色短柔毛,内面无毛,内轮花瓣披针形,长达6毫米,宽达3.5毫米,基部内弯;雄蕊卵圆形,3排,药隔顶端急尖;心皮1个,长圆形,长4毫米,密被长柔毛,内有胚珠12颗,2排,柱头近圆球状,无毛,顶端浅2裂。 花期4月。

产于云南东南部。生于海拔约400米山地疏林中。越南也有。本种模式标本采自越南河内。

4. 藤春(海南) 山坝(海南);金榕(海南万宁);唛嫩(广西壮语);咪翠岗、咪囤、咪念、米将子(广西);阿芳(植物学名词审查本、海南植物志);单果阿芳(中国植物学杂志) 图版 49: 1—11



金平藤春 *Alphonsea boniana* Finet et Gagnep., 1. 花枝; 2. 花蕾; 3. 萼片外面观; 4. 萼片内面观; 5. 外轮花瓣内面观; 6. 内轮花瓣内面观; 7. 雄蕊背面观; 8. 雄蕊侧面观; 9. 雄蕊腹面观; 10. 除去花瓣和花萼的花; 11. 子房纵切面。(陈国泽绘)