

轮花瓣近相等或内轮的较小, 绿色或黄色, 长而扁平, 极张开; 雄蕊多数, 线形或线状披针形, 药室外向, 药隔延伸为披针形的尖头; 心皮多数, 每心皮有胚珠多颗, 2 排, 柱头近头状。成熟心皮浆果状, 有柄或无柄; 种子多颗, 灰黑色, 有斑点; 胚乳具针状凸体。

约 4 种, 分布于亚洲热带地区至大洋洲。我国栽培 1 种及 1 变种。

本属模式种为: *Cananga odorata* (Lamk.) Hook. f. et Thoms.

1. 依兰(种子植物名称) 加拿楷(中国植物学杂志); 依兰香(热带植物研究); 锅裸刹版那(云南傣语); 香水树(台湾)

*Cananga odorata* (Lamk.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 130. 1855, et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 56. 1872; Miq. Fl. Ind. Bat. 1 (2): 40. 1858; Kurz, For. Fl. Brit. Burma 1: 3. 1877; Finet et Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 64. 1907; Ridl. Fl. Mal. Pen. 1: 43. 1922; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 706, 图 16. 1935; 陈蝶, 中国树木分类学 325, 图 246. 1937; Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 69. 1938; Baill. Mam. Cult. Pl. 420. 1949; Sincl. in Gard. Bull. Singap. 14: 324. 1955; Back. et Bakh. Fl. Java 1: 105. 1963; 刘业经, 台湾木本植物志 126. 1972; 云南经济植物 257, 图 197. 1972.—*Uvaria odorata* Lamk. Encyc. 1: 595. 1783, et Ill. tab. 495, et fig. 1. 1793.—*Canangium odoratum* Baill. Hist. Des. Pl. 1: 213. 1868 (in not.).

1a. 依兰(原变种) 图版 53

var. *odorata*

常绿大乔木, 高达 20 多米, 胸径达 60 厘米; 树干通直, 树皮灰色; 小枝无毛, 有小皮孔。叶大, 膜质至薄纸质, 卵状长圆形或长椭圆形, 长 10—23 厘米, 宽 4—14 厘米, 顶端渐尖至急尖, 基部圆形, 叶面无毛, 叶背仅在脉上被疏短柔毛; 侧脉每边 9—12 条, 上面扁平, 下面凸起; 叶柄长 1—1.5 厘米。花序单生于叶腋内或叶腋外, 有花 2—5 朵; 花大, 长约 8 厘米, 黄绿色, 芳香, 倒垂; 总花梗长 2—5 毫米, 被短柔毛; 花梗长 1—4 厘米, 被短柔毛, 有鳞片状苞片; 萼片卵圆形, 外反, 绿色, 两面被短柔毛; 花瓣内外轮近等大, 线形或线状披针形, 长 5—8 厘米, 宽 8—16 毫米, 初时两面被短柔毛, 老渐几无毛; 雄蕊线状倒披针形, 基部窄, 上部宽, 药隔顶端急尖, 被短柔毛; 心皮长圆形, 被疏微毛, 老渐无毛, 柱头近头状羽裂。成熟心皮 10—12, 有长柄, 无毛, 成熟的果近圆球状或卵状, 长约 1.5 厘米, 直径约 1 厘米, 黑色。花期 4—8 月, 果期 12