

270. 1781.——*Anona uncinata* Lamk. Enc. 2: 127. 1786.——*Uvaria uncata* Lour. Fl. Cochinch. 349. 1790, non Vahl.——*U. esculenta* Roxb. ex Rottl. in Ges. Nat. Freund. Neue Schr. 4: 201. 1803.——*Artabotrys odoratissimus* R. Br. ex Ker in Bot. Reg. 5: tab. 423. 1819, non Bl. (1830).——*U. odoratissima* Roxb. Fl. Ind. 2: 666. 1824.——*Artabotrys uncatus* (Lour.) Baill. Hist. Pl. 1: 232. 1868.——*Artabotrys uncinatus* (Lamk.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 7: 234. 1912, et in Trans. Am. Philos. Soc. 24: 162. 1935; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 696, 图 10. 1935; 侯宽昭, 广州植物志 86, 图 26. 1956; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 238, 图 115. 1964; 刘业经, 台湾木本植物志 125. 1972.

攀援灌木, 高达 4 米, 无毛或近无毛。叶纸质, 长圆形或阔披针形, 长 6—16 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部楔形, 叶面无毛, 叶背沿中脉上被疏柔毛或无毛。花 1—2 朵, 淡绿色或淡黄色, 芳香; 萼片绿色, 卵形, 长约 8 毫米, 两面被稀疏柔毛; 花瓣长圆状披针形, 长 3—4.5 厘米, 外面基部密被柔毛, 其余近无毛或稍被稀疏柔毛, 近基部收缩; 雄蕊长圆形, 药隔三角形, 无毛; 心皮长圆形, 柱头线状长椭圆形。果卵圆状, 长 2.5—4 厘米, 直径约 2.5 厘米, 顶端尖, 数个群集于果托上。花期 5—8 月, 果期 5—12 月。

产于浙江、台湾、福建、江西、广东、广西和云南等省区, 多见于栽培, 少数为野生。印度、斯里兰卡、泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国也有栽培或野生。本种模式标本采自印度马德拉斯栽培植物(原植物引自我国南部)。

绿化植物, 花极香, 常栽培于公园或屋旁。鲜花含芳香油 0.75—1.0% 左右, 可提制鹰爪花浸膏, 用于高级香水化妆品和皂用的香精原料, 亦供熏茶用。根可药用, 治疟疾。

3. 香港鹰爪花(中国树木分类学) 港鹰爪(中国植物学杂志); 香港鹰爪(海南植物志); 野鹰爪藤(广西上思) 图版 56: 1—9

*Artabotrys hongkongensis* Hance in Journ. Bot. 8: 71. 1870; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 26. 1886; Finet et Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 53, Mém. 4: 101. 1906, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 78. 1907; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. 10: 30. 1912; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 58. 1940; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 697. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 319. 1937; 吴征镒、王文采, 植物分类学报 6: 208. 1957; 蒋英、李秉滔,

海南植物志 1: 239. 1964.

攀援灌木, 长达 6 米; 小枝被黄色粗毛。叶革质, 椭圆状长圆形至长圆形, 长 6—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 顶端急尖或钝, 基部近圆形或稍偏斜, 两面无毛, 或仅在下面中脉上被疏柔毛, 叶面有光泽; 侧脉每边 8—10 条, 两面均凸起, 远离边缘而联结, 网脉疏散, 明显; 叶柄长 2—5 毫米, 被疏柔毛。花单生; 花梗稍长于钩状的总花梗, 被疏柔毛; 萼片三角形, 长约 3 毫米, 近无毛; 花瓣卵状披针形, 长 10—18 毫米, 基部卵形, 凹陷, 外轮花瓣密被丝质柔毛, 厚质, 内轮花瓣长 10—12 毫米; 雄蕊楔形, 药隔三角形, 顶端隆起, 被短柔毛; 心皮卵状长圆形, 无毛, 每心皮有胚珠 2 颗, 基生, 柱头短棍棒状。果椭圆状, 长 2—3.5 厘米, 直径 1.5—3 厘米, 干时黑色。花期 4—7 月, 果期 5—12 月。


产于湖南、广东、广西、云南和贵州等省区。生于海拔 300—1500 米山地密林下或山谷荫湿处。越南也有。本种模式标本采自广东南部岛屿。

4. 狭瓣鹰爪花(中国树木分类学) 狭瓣鹰爪(中国植物学杂志) 图版 56: 10—16

*Artabotrys hainanensis* R. E. Fries in Arkiv Bot. Stockh. andra ser. 3: 41. 1955; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 239. 1964.——*A. stenopetalus* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 226, fig. 24. 1935; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 696. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 319. 1937, non Engl. in Not. Bot. Gart. Mus. Berlin 2: 300. 1898.

攀援灌木; 小枝无毛。叶纸质, 长圆形至长椭圆形, 长 7—15 厘米, 宽 3—6 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部圆形或阔楔形, 上面无毛, 下面仅脉上被稀短柔毛; 侧脉每边 7—9 条, 纤细, 两面均凸起, 顶端弯拱而联结, 网脉疏散, 明显; 叶柄长 4—8 毫米, 无毛。总花梗与叶对生, 钩状下弯, 无毛; 花梗长 12—15 毫米, 上部略粗, 无毛; 花白黄色; 萼片卵形, 长 4—5 毫米, 外面被疏柔毛; 外轮花瓣狭披针形, 长约 2 厘米, 宽约 4 毫米, 渐尖, 两面均被紧贴的粗毛, 基部稍阔, 凹陷, 内轮花瓣与外轮相似; 雄蕊长圆形, 长 14 毫米, 宽 5 毫米, 药隔圆形至近截形, 无毛; 心皮约 15 个, 略长于雄蕊, 无毛, 柱头短棍棒状。果椭圆状, 长约 2.5 厘米, 直径约 1.2 厘米。花期 5 月, 果期 8 月。

产于广东海南岛。生于低海拔至中海拔密林中。本种模式标本采自海南岛崖县乳岭。



1—9. 香港魔爪花 *Artabotrys hongkongensis* Hance, 1. 花枝; 2. 花; 3. 外轮花瓣外面观; 4. 内轮花瓣外面观; 5. 内轮花瓣内面观; 6. 雄蕊背面观; 7. 雄蕊腹面观; 8. 心皮纵切面, 示胚珠着生; 9. 果枝。10—16. 狭瓣魔爪花 *Artabotrys hainanensis* R. E. Fries, 10. 花; 11. 除去花瓣的花; 12. 外轮花瓣侧面观; 13. 内轮花瓣内面观; 14. 内轮花瓣外面观; 15. 雄蕊背面观; 16. 心皮纵切面, 示胚珠着生。(陈国泽绘)