

2. 叶背苍白色;花暗红色,直径1—1.5厘米,花瓣披针形;药隔顶端截形
 2. 喙果皂帽花 *D. rostratum* Merr. et Chun
 2. 叶背灰绿色;花黄色,直径3厘米,花瓣长椭圆形或卵圆形;药隔顶端宽三角形
 3. 黄花皂帽花 *D. sootepense* Craib

1. 皂帽花(海南) 儋丹皂帽花(中国植物学杂志);毛皂帽花(海南通什);鸡朵乎(海南澄迈);菴罗(广东廉江);乌木兰(海南尖峰岭) 图版 76: 11

Dasymaschalon trichophorum Merr. in Lingnan Sci. Journ. 6: 326. 1928, et in Sunyatsenia 1: 194. 1934; 蒋英, 中国植物学杂志 2 (3): 687. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 313. 1937; 蒋英、李秉滔, 海南植物志 1: 257. 1964. — *D. macrocalyx* sensu Ast in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 115. 1938; N. T. Ban in Bot. Journ. URSS. 60 (2): 232. 1975, non Finet et Gagnep.

直立灌木,高1—3米;幼枝、叶背、叶柄、叶脉及花梗均密被长柔毛。叶纸质,长圆形至阔长圆形,长7—15厘米,宽2.5—4厘米,顶端急尖而钝头,基部圆形或浅心形,上面除中脉被疏长柔毛外无毛,干时淡绿色,下面灰绿色;侧脉每边10—14条,上面扁平,下面凸起,网脉不明显;叶柄极短,几无柄或长2—3毫米。花红色,单朵腋生;花蕾尖帽状,长2—3厘米,基部宽8—10毫米;花梗细,长1—3厘米;小苞片宿存,阔卵形或长圆状卵圆形,长约5毫米,被长柔毛;萼片阔卵形至卵状披针形,长1—1.5厘米,两面被疏长柔毛,结果时宿存;花瓣厚,披针形,长2—2.8厘米,基部宽6—8毫米,外面被紧贴灰色的柔毛,内面无毛;雄蕊长约2毫米,药隔披针形;心皮约10个,被粗毛,柱头无毛。果念珠状,无毛或几无毛,下承托以宿存的萼片,果节圆球状,长5—6毫米,直径约5毫米,顶端急尖或有小尖头。花期4—7月,果期7月—翌年春季。

产于广东、广西。生于丘陵山地疏林中或低海拔的灌木丛中。本种模式标本采自海南儋县。

本种与越南产的 *Dasymaschalon macrocalyx* Finet et Gagnep. 有区别。我们根据前者模式标本与后者模式产地标本作比较,它们的区别在于: 越南种的花顶生,花梗短,长2—3毫米,柱头被毛,果密被白色刚毛。而我国种的花腋生,花梗较长,长1—3厘米,柱头无毛,果无毛或几无毛等不同。因此,我们不同意 M. Ast (in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 115. 1938) 和 N. T. Ban [in Bot. Journ. URSS. 60 (2): 232. 1975] 将它们合并。

2. 喙果皂帽花(中国植物学杂志) 白叶皂帽花(中国植物学杂志);白面(海南



1—10. 喙果皂帽花 *Dasymaschalon rostratum* Merr. et Chun, 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花, 切去花瓣的一部分, 示雌雄蕊; 4. 花萼; 5. 花瓣内面观; 6. 雄蕊背面观; 7. 雄蕊腹面观; 8. 花托、雄蕊和雌蕊的纵切面; 9. 心皮; 10. 心皮的纵切面, 示胚珠的着生。11. 皂帽花 *Dasymaschalon trichophorum* Merr., 花枝。(陈国泽绘)