

var. *glauca*

乔木，高达 23 米，全株无毛；树皮灰褐色，有不规则的纵裂。小枝黑褐色或棕色，有浅纵纹。顶芽纤细，芒状，微弯，长近 1 厘米。叶互生，坚纸质或近革质，卵形或卵状披针形或阔椭圆形，长 7—15 厘米，宽 3.5—6.5 厘米，先端短渐尖、渐尖或钝，常偏斜，基部近圆形，两侧对称或不对称，上面绿色，有光泽，下面粉绿或粉褐色，中脉上面平坦，侧脉每边 6—8 条，纤细，两面均凸起，常带红褐色，小脉密网状，干后略呈蜂巢状小窝穴；叶柄长 1.2—2.7 厘米。圆锥花序腋生，柔弱，长 2—6 厘米，无毛，少花；花白色；花被裂片阔卵形，外面无毛，内面有微柔毛，第三轮花丝基部有 2 腺体，有毛；退化雄蕊箭头形，基部有毛。果椭圆形，长 2.5—3.5 厘米，直径 1.5—2.3 厘米，两端钝，干后黑色，平滑；果梗粗约 2 毫米。花期 2 月，果期 8—12 月。

产广东(海南)。常生于山坡混交林中。

25b. 顶序琼楠(变种)

var. *glaucooides* H. W. Li in *Act. Phytotax. Sin.* 17 (2): 66, pl. 12, f. 2. 1979.

与原变种不同在于圆锥花序于幼枝上全然顶生，长达 10 厘米，庞大而疏松，多分枝，多花，序轴上疏被短柔毛。

产云南东南部。常生于海拔约 1300 米的石灰岩山林下。

26. 台琼楠

Beilschmiedia erythrophloia Hay. *Icon. Pl. Formos.* 4: 20. 1914, 5: 150, fig. 53a. 1915; *Kanehira, Formos. Trees rev. ed.* 198, fig. 144. 1936; Allen in *Journ. Arn. Arb.* 23: 447. 1942; H. L. Li, *Woody Fl. Taiwan*, 200, fig. 74. 1963; *中国高等植物图鉴* 1: 834. 图 1668. 1972; Liu, *Lign. Pl. Taiwan* 129. f. 24-c. 1972; C. E. Chang in *Fl. Taiwan* 2: 407, pl. 353. 1976. ——*B. erythrophloia* Hay. var. *tanakae* (Hay.) *Kanehira* in *Trans. Nat. Hist. Soc. Formos.* 25: 241. 1935.

乔木，干耸直，胸径达 1 米；树皮光亮，灰褐色，常不规则片状剥落。顶芽卵形，无毛。叶对生或互生，革质，长椭圆形、卵状长圆形或卵状披针形，长 7—11 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，先端尾尖或渐尖，有时钝，基部楔形，两面无毛，多少偏斜，干后暗褐色，光亮，网脉显著，中脉和侧脉两面凸起；叶柄长 1—2 厘米。圆锥花序腋生或近顶生，无毛；花梗长 2—5 毫米；花被裂片椭圆形，长约 2 毫米，宽 1.5 毫米。果椭圆形，长 1.5—2 厘米，直径 1—1.2 厘米，熟时深褐色，果皮坚硬；果梗几不增粗。花期夏季。

产我国台湾。生于岛上阔叶混交林上部，但在中部的低海拔地区更常见。日本(琉球群岛)也有分布。

27. 广东琼楠 图版 37: 1