

直径 4.5 厘米,干时具皱纹,外密被锈褐色鳞秕毛被;果梗粗壮,连总梗长 2—4 厘米,圆柱形,先端略增粗,宽 4—6 毫米,锈褐色。 果期 10 月。

产云南东南部(屏边)。生于密林中,海拔 1200 米。

2. 麻栗坡油果樟 图版 40: 9—11

Syndiclis marlipoensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 72, pl. 10, f. 5. 1979.

灌木,高约 2.5 米。顶芽小,卵珠形,长约 1.5 毫米,密被锈色短柔毛。一年生枝条近圆柱形,紫褐色,具纵向细条纹,密布栓质皮孔,变无毛,当年生枝条多少压扁,极密被锈色短柔毛。叶近对生或互生,椭圆形至长圆形,长 13—16.5 厘米,宽 5.5—8.3 厘米,先端短渐尖或有时钝形,边缘略背卷,坚纸质,干时上面淡黄褐色,光亮,下面淡紫褐色,晦暗,上面无毛,下面主要沿中脉被锈色疏柔毛,侧脉每边 5—7 条,弧曲状,末端拱形连结,最下方一条常极近叶缘,与中脉和横脉在上面十分凹陷下面明显凸起,细脉在上面模糊下面隐约可见且呈细密蜂巢状浅窝穴;叶柄长 0.8—1.5 厘米,腹平背凸,红褐色,密被锈色短柔毛。圆锥花序腋生,长约 2.5 厘米,少花,总梗长 1.3 厘米,与各级序轴被锈色短柔毛。初果期的花梗长 1.5 毫米,略被短柔毛。初果期的花被长 1.5 毫米,外面无毛,内面密被黄褐色短柔毛,筒倒锥形,长约 1 毫米,花被裂片 4,偶有 5,宽卵圆形。初果期子房伸长,线形,长达 5 毫米,无毛。 果期 11 月。

产云南东南部(麻栗坡)。生于常绿阔叶林中,海拔 1300—1600 米。

3. 油果樟 白面柴(广东海南),油樟(海南植物志)

Syndiclis chinensis Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 462. 1942; 海南植物志 1: 286, f. 142. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 837, 图 1674. 1972.

乔木,高达 20 米,胸径达 24 厘米。小枝带褐色,有条纹和皮孔,幼时有锈色小绒毛,后变无毛。叶对生或互生,卵形或椭圆形,长 6—13.5 厘米,宽 2.5—8 厘米,先端渐尖、急尖或钝形,基部常不对称,下面苍白色,两面有微小的蜂巢状浅窝穴,老时无毛或下面渐变无毛,幼叶下面有微细柔毛,革质,中脉淡褐色,在上面下陷,下面凸起,侧脉每边 3—5 条,网脉两面密而明显;叶柄长不超过 2 厘米,淡褐色。圆锥花序腋生,长可达 4 厘米,被锈色绒毛,少花,总梗短。花绿黄色,长 1.5 毫米,有锈色绒毛;花梗短,长约 1.5 毫米。花被裂片 4,卵形。能育雄蕊 4,稍超出花被,近无柄,花药 2 室,室内向,外轮 2 枚雄蕊基部有腺体。退化雄蕊 4,与能育雄蕊对生,被柔毛。果陀螺形,基部收缩成短柄,长 3.5—4 厘米,直径约 3 厘米,基部粗约 1 厘米,干时黑红色,无毛;果梗与总梗难于区别,长约 4 厘米,宽 1 厘米,有锈色条纹,无毛。 花期 4—5 月,果期 9—10 月。

产广东(海南的南部)。生于林谷中或常绿阔叶林中,海拔约 480 米。

4. 富宁油果樟 图版 39: 1—8

Syndiclis fooningensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 72, pl. 10,