

f. 6. 1979.

小乔木，高3—8米。顶芽小，卵珠形，长约3毫米，芽鳞外面极密被黄褐色短柔毛。一年生枝条圆柱形，直径约2毫米，褐色，具纵向条纹，有栓质椭圆形皮孔，无毛，当年生枝条纤细，有时多少压扁，红褐色，密被锈色短柔毛。叶近对生或互生，卵圆形或椭圆形，长5.5—10厘米，宽2.5—5厘米，先端锐尖至短渐尖，常偏斜，基部宽楔形，近革质，边缘背卷，老叶干时上面黄褐色下面淡黄褐色或变褐色，幼时两面被锈色短柔毛下面沿脉上尤为密集，老时上面变无毛下面多少被锈色短柔毛，侧脉每边3—6条，与中脉上面凹陷下面明显凸起，末端拱形连结，最下方一条极近叶缘，横脉上面模糊下面多少明显且其间有不明显的小脉网结；叶柄长0.8—1.5厘米，腹平背凸，幼时极密被锈色短柔毛，老时渐变无毛。圆锥花序于一年生枝条上部腋生，少花，未开花时长0.9—1.2厘米；总梗长1—5毫米，与各级序轴被锈色疏柔毛；小苞片钻形，长不及1毫米，被锈色短柔毛。花绿色，小，芽时长不及1毫米；花梗纤细，长达1.5毫米，密被锈色短柔毛。花被外面无毛，内面被短柔毛，筒倒锥形，花被裂片4，宽三角形，极短小。能育雄蕊4，排成2轮，外轮雄蕊基部有一对腺体，花药2室，室内向，花丝被短柔毛。退化雄蕊4，线形，密被柔毛。子房卵形，花柱渐狭。果近扁球形，高约3厘米，直径3.3厘米，顶端近截平，光滑，无毛，干时呈黄褐色。花期4—5月。

产云南东南部(富宁)。生于石灰岩山或沟谷密林中，海拔800—1000米。

5. 乐东油果樟 乐东油樟(海南植物志)

Syndiclis lotungensis S. Lee in Act. Phytotax. Sin. 8: 191. 1963; 海南植物志 1: 286. 1964; 海南主要经济树木 203, f. 47. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 837, 图 1674. 1972.

乔木，高可达20米，胸径20厘米；枝皮灰紫褐色，片状脱落。枝条灰紫褐色，有皱纹，小枝黑红色，稍扁，有条纹和皮孔，嫩时密被锈色绒毛。叶互生或近对生，宽卵形或椭圆形，长7.5—14厘米，宽4—8厘米，先端急尖，基部宽楔形，厚纸质，上面绿色，无毛，下面稍苍白色，疏被短柔毛，两面有细密蜂巢状浅窝穴，叶脉在上面下陷，下面明显凸起，侧脉每边4—7条，末端拱形连结，最下方一条极近叶缘，横脉下面很清晰；叶柄长约2厘米，有锈色绒毛。花未见。果球形，直径约4厘米，干时褐色，平滑，无毛，顶端有细尖头；果梗粗，与总梗难于区分，连总梗长约4厘米，直径约1厘米，有皱纹，顶端稍弯。果期10月。

产广东海南的西南部(乐东)。生于山坡和山谷的常绿林或热带雨林中，海拔400—900米。

果仁榨油，油供制皂和作润滑油用，油粕可作肥料。木材纹理略交错，结构细致，材质稍硬而轻，易于加工，干燥后稍为开裂，会变形，不很耐腐，纵切面平滑而具光泽，生长轮略现花纹，惟不很鲜明，适于作梁、柱、门、窗、农具以至一般较好的家具和器具等用材。