

覆盖子房。子房卵状圆锥形,长约1毫米,无毛,花柱线形,长1.2毫米,柱头小。果圆球形,直径达5厘米,未成熟时绿色,干时呈红褐色,平滑,无毛,顶端浑圆或具不明显的细小尖头。花、果期9—10月。

产云南东南部(西畴)。生于湿润的密林中,海拔1300—1780米。

8. 广西油果樟 图版40: 1—7

Syndiclis kwangsiensis (Kosterm.) H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 73. 1979. — *Beilschmiedia kwangsiensis* Kosterm. in Reinwardtia 7: 453. fig. 8. 1969. — *Potameia kwangsiensis* Kosterm. in Adansonia 17 (1): 92. 1977 syn. nov. e descr. — *Beilschmiedia balansae* auct. non Lec.; H. T. Chang in 中山大学学报自然科学版 1960 (1): 24. 1960.

小至大乔木,高8—23米,胸径15—45厘米;树皮灰色。顶芽细小,卵珠形,芽鳞密被锈色短柔毛。一年生枝条圆柱形,黄褐色,具纵向裂纹,密布皮孔,无毛;当年生枝条多少具棱角,有纵向条纹,密布疣突,红褐色,无毛。叶互生,椭圆形至卵状椭圆形,长10—13厘米,宽5—7厘米,先端骤然短渐尖,尖头长达2厘米,钝头,基部宽楔形至近圆形,两侧近相等,边缘背卷且呈波状,干时上面黄褐色下面苍白色,幼时坚纸质,老时近革质,侧脉每边约6条,基部的侧脉近叶基斜生出且不完全发育,中脉及侧脉在上面凹陷下面明显凸起,横脉及小脉网结,幼时脉网在两面多少明显且呈浅蜂巢状窝穴,老时上面脉网不明显下面仅横脉隐约可见;叶柄长1—1.5厘米,腹平背凸,无毛。圆锥花序腋生,长(2.5)3—6.5厘米,通常单一,但常为2—3并生,少花,其上无苞叶;总梗长(1.5)2—3.5厘米,多少压扁,红褐色,无毛,分枝短小,长1—1.5厘米;小苞片钻形,微小,长不及1毫米,早落。花黄色,小,长约2毫米,直径约2毫米;花梗纤细,长达3毫米,无毛。花被两面无毛,花被筒倒锥形,长约1毫米,花被裂片4,宽三角状卵形,长宽约1毫米,先端钝。能育雄蕊4,稍超出花被,花药宽三角形,长约0.5毫米,先端锐尖,2室,室内向,花丝稍长于花药,被柔毛,外轮2枚基部有一对腺体。退化雄蕊4,与能育雄蕊对生,线形,长0.6毫米,密被柔毛。子房长三角状卵球形,长1.5毫米,无毛,先端渐狭,柱头小,不明显。成熟果圆球形,直径达5厘米,干时呈红褐色,平滑,无毛,顶端浑圆,具不明显的小尖突,果皮木栓质,种子1,与果同形。花期4月,果期10月。

产广西西南部(十万大山)。生于山地山谷密林中,海拔300—650米。

9. 屏边油果樟 图版40: 8—9

Syndiclis pingbienensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 73, pl. 11, f. 2. 1979.

乔木,高10—25米。顶芽细小,卵珠形,长约1.5毫米,芽鳞紧包,外面密被锈色短柔毛。一年生枝条圆柱形,直径约3.5毫米,具纵向条纹,红褐色,密布栓质皮孔,无毛;当年生枝条多少压扁,无毛。叶互生,卵状椭圆形,长6.5—11.5厘米,宽2.7—6.3厘米,先端



1—7. 广西油果樟 *Syndiclis kwangsiensis* (Kosterm.) H. W. Li: 1.花枝, 2.花, 3.花纵剖面, 4.外轮雄蕊, 5.内轮雄蕊, 6.退化雄蕊, 7.果。8—9. 屏边油果樟 *S. pingbienensis* H. W. Li: 8.幼果枝, 9.果。10—11. 西畴油果樟 *S. sichourensis* H. W. Li: 10.花枝, 11.果。(曾孝濂绘)