

筒倒锥形,长 0.5 毫米,花被裂片 6,宽卵圆形,近等大,长约 1.5 毫米,宽约 1.1 毫米,先端钝。能育雄蕊 9,花丝被柔毛,第一、二轮雄蕊长约 1 毫米,花药宽卵圆形,先端钝,药室内向,与花丝几等长,第三轮雄蕊长 1.2 毫米,花药长圆形,稍短于花丝,花丝扁平,近基部有一对无柄的腺体。退化雄蕊 3,位于最内轮,短小,长约 0.6 毫米,匙形,具柄。子房卵珠形,长 0.8 毫米,无毛,花柱短小,长 0.7 毫米,柱头不明显。果近球形,直径约 8 毫米,顶端具小尖头;果托增大,长达 12 毫米,顶端宽 7 毫米,干时具纵槽。花期 6—8 月,果期 8—10 月。

产云南东南部及南部。生于山坡疏林中水沟旁或沟谷密林中,海拔 380—600 米。

组 2. 肉桂组——Sect. *Cinnamomum*——*Cinnamomum* sect. *Malabathrum* Meissn. in DC. Prodr. 15 (1): 10. 1864.

花被片宿存,或上部脱落下部留存在花被筒的边缘上,芽裸露或芽鳞不明显;叶对生或近对生,三出脉或离基三出脉,侧脉脉腋下面无腺窝上面无明显泡状隆起。

18. 网脉桂 土樟(台湾) 图版 49: 1

*Cinnamomum reticulatum* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 239. 1911; Icon. Pl. Formos. 5: 160, f. 53e. 1915; Nakai in Bot. Mag. 32: 218. 1918; Sasaki, List Pl. Formosa 193. 1928; Cat. Gvt. Herb. Taihoku 22. 1930; Makino & Nemoto, Fl. Jap. ed. 2 367. 1931; Kudo et Masamune in Ann. Rep. Bot. Gard. Taihoku Imp. Univ. 2: 92. 1932; Y. Kudo, Rep. 17, List Cult. Pl. Dept. For. 64. 1934; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 211. 193b; Huang et al. in Taiwan 8: 52. 1962; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 202. 1963; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 420, pl. 358. 1976.

小乔木。顶芽卵珠形,芽鳞干膜质,无毛。枝条粗糙,带红色,无毛,叉开。叶近对生,倒卵形,长 4—6 厘米,宽 2—3 厘米,先端钝或圆形,基部渐狭,边缘内卷,近革质,上面暗绿色,光亮,下面苍白色,晦暗,三出脉或离基三出脉,中脉直贯叶端,其上每边有 2—3 条小支脉,横脉及细脉两面显著,网结状,凸起;叶柄长 1—1.5 厘米。花序腋生,伞房状,无毛,具 (1)3—5 花,长 (1.5)2—5 厘米。花被裂片 6,卵圆形,近等大,长 3.5 毫米,先端钝,具 5 脉,外面有少数白点,内面贴生短柔毛。能育雄蕊 9,近等长,长约 3 毫米,第一、二轮雄蕊花丝无腺形,匙形,第三轮雄蕊花丝中部有一对长约 1 毫米的卵圆形无柄腺体。退化雄蕊 3,位于最内轮,箭头状,长约 2.5 毫米,具柄。子房粗壮,花柱长 3 毫米,柱头增大成盘状,顶端微凹。果卵球形,长约 1 厘米,宽 7 毫米;果托增大,先端截形,花被片自基部脱落。果期 11 月。

产我国台湾。生于低海拔处。

19. 少花桂 岩桂、香桂、三条筋、三股筋、香叶子树、臭乌桂(四川),臭樟(贵州),



1. 网脉桂 *Cinnamomum reticulatum* Hay.: 花枝。2—7. 少花桂 *C. pauciflorum* Nees: 2. 花枝, 3. 花纵剖面, 4. 第一、二轮雄蕊, 5. 第三轮雄蕊, 6. 退化雄蕊, 7. 果。8—14. 野黄桂 *C. jensenianum* Hand.-Mazz.: 8. 花枝, 9. 花纵剖面, 10. 第一、二轮雄蕊, 11. 第三轮雄蕊, 12. 退化雄蕊, 13. 花被片, 内面观, 14. 花被片, 外面观。(肖溶绘)