

其花药4室并不排列于同一平面上,而是上2室,下2室,且本种花为单性异株, Koster-mans 的组合显然是不当的。因此,我们仍用 Meissner 的学名。

2. 倒卵叶黄肉楠 假簕衣叶(云南屏边), 莫苏(云南屏边哈尼语), 把漂(云南河口瑶语), 恰嘎兴(西藏墨脱门巴语)

Actinodaphne obovata (Nees) Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 342. 1851; Hook. f. Fl. Brit. India 5: 153. 1886; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 158. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 404. 1938. — *Tetranthera obovata* Hamilt. ex Wall. List. no. 2562. 1830. — *Tetradenia obovata* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 64. 1831. — *Laurus obovata* Hamilt. ex Nees in Wall. l. c. — *Litsea obovata* Nees, Syst. Laurin. 636. 1836, non Hayata 1911.

乔木,高10—18米,胸径约20厘米。小枝粗壮,密被锈色短柔毛,老时渐变无毛。顶芽大卵圆形,芽鳞外面被黄褐色微柔毛。叶3—5片簇生于枝端成轮生状,倒卵形、倒卵状长圆形或椭圆状长圆形,长15—50厘米,宽5.5—22厘米,先端渐尖或钝尖,基部楔形或略圆,薄革质,幼时两面有锈色短柔毛,老时上面无毛或沿脉略被短柔毛,有光泽,下面粉绿色,有锈色短柔毛或近于无毛,离基三出脉,中脉在叶上面略隆起,下面隆起,粗壮,侧脉每边6—7条,最下两条对生或近于对生,离叶基部1—2厘米处发出,斜展,先端弧曲,横脉平行,在叶下面明显;叶柄长3—7厘米,粗壮,被黄褐色短柔毛。伞形花序多个排列于总梗上构成总状,总梗长1.2—2.5厘米,密被黄褐色短柔毛;每一伞形花序有花5朵;花被裂片6,黄色,卵圆形,两面有明显3条直脉,并有腺点,外面有黄褐色短柔毛,内面基部具柔毛。雄花梗长约3毫米,有黄褐色短柔毛;花被裂片长4毫米,宽2.5毫米;能育雄蕊9,长3.6毫米,花丝短,基部有长柔毛,第3轮基部两侧的腺体扁圆形,无柄;退化雌蕊长2.5毫米,花柱短,子房有柔毛,柱头大,2浅裂。雌花略较雄花小;花梗长1.8—2毫米;花被长2.8—3毫米,宽1.5—2毫米;子房近圆形,有长柔毛,花柱短,柱头大,2浅裂。果长圆形或椭圆形,长2.5—4.5厘米,直径1—2厘米,顶端具尖头,成熟时紫红色或黑色,生于扁平盘状果托上;果托直径可达1厘米;果梗粗壮,直径2—3毫米,长5—6毫米。花期4—5月,果期至翌年3月。

产云南南部至东南部、西藏东南部。生于山谷溪旁或润湿的混交林中,海拔1000—2700米。印度也有分布。

本种果大,种子含油脂,可供榨油,群众多用作点灯。树皮辛温香,民间入药,外敷治骨折。

3. 隐脉黄肉楠 图版66: 1

Actinodaphne obscurinervia Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 61, f. 20. 1978.

小乔木,高3米。当年生枝褐色,有贴伏短柔毛,二年生枝黑褐色,有贴伏短柔毛,老