

和叶柄被白色绒毛,果梗细长,果实较大,而后者嫩枝密被绒毛,叶片下面和叶柄被黄色绒毛,果梗较短,果实亦较小。Fenzel 507 号标本另立为秦岭木姜子。

本种与钝叶木姜子 *L. veitchiana* Gamble 相似,但小枝红褐色,无毛,叶片下面和叶柄均被白色绒毛,花丝无毛,雄花中无退化雌蕊,果梗细瘦,易于区别。

8. 宝兴木姜子 吃木姜、木姜子(四川宝兴),老哇皮(四川松潘)

Litsea moupinensis Lec. in Bull. Soc. Bot. France 60: 84. 1913; et in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Sér. 5: 88. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 257. 1931; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 187. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 370. 1938.—*Litsea microcarpa* Yang in Journ. West China Bord. Res. Soc. 15 Ser. B: 78. 1945, syn. nov.—*Lindera puberula* Franch. Pl. David. 2: 115. 1887.—*Benzoin puberula* (Franch.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 1: 145. 1919; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 41. 1925.

8a. 宝兴木姜子(原变种) 图版 73: 2

var. *moupinensis*

落叶乔木,高 15—20 米;树皮褐色。幼枝黄褐色,密被黄褐色绒毛。顶芽圆锥形,密被黄褐色绒毛。叶互生,卵形、菱状卵形或长圆形有时也有倒卵形,长 4—9 厘米,宽 1.5—3.8 厘米,两端渐尖,纸质,上面深绿色,下面灰绿色,密被灰黄色绒毛,羽状脉,侧脉每边 5—7 条,直展至近叶缘处略弯曲,叶脉在叶上面微突,下面突起,叶下面连结侧脉的小脉明显突起;叶柄长 3—13 毫米,密被黄色绒毛。伞形花序单生去年枝顶,先叶开放;花序总梗长 2—3 毫米,被绒毛;每一花序有花 8—10 朵,花梗长 5—8 毫米,密被黄色绒毛;花被裂片 6,黄色,近圆形,外面中肋有柔毛;能育雄蕊 9,花丝无毛,第 3 轮基部腺体黄色,有柄;退化雌蕊细小,无毛。果球形,直径 3—4 毫米,成熟时黑色;果梗长 5—10 毫米,有短柔毛。花期 3—4 月,果期 7—8 月。

产四川。生于山地路旁或杂木林中,海拔 700—2300 米。

叶有樟脑香味,可提取芳香油;种子可榨油,供工业上用。当地群众用其果实作食用香精。

8b. 四川木姜子(变种)

var. *szechuanica* (Allen) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 47. 1978.—*Litsea szechuanica* Allen in Journ. Arn. Arb. 22: 18. 1941, p. p. quoad specim. C. S. Fan et Class 139, F. T. Wang 22737, T. T. Yü 418.

与原变种不同在于叶片为椭圆形或倒卵形,间或有近圆形的小叶,通常较大,长 4—15 厘米,宽 2—7 厘米,先端短渐尖或圆钝或突尖,基部楔形,果序总梗长 3—10 毫米。



1. 钝叶木姜子(原变种) *Litsea veitchiana* Gamble var. *veitchiana*; 果枝。 2. 宝兴木姜子
(原变种) *L. moupinensis* Lec. var. *moupinensis*; 果枝。(宗维城绘)