

14b. 毛果木姜子(变种)

var. *trichocarpa* (Yang) H. S. Kung in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 48. 1978.——*Litsea sericea* Hook. f. var. *trichocarpa* Yang in Journ. West China Bord. Res. Soc. 15 Ser B: 79. 1945.

与原变种不同在于叶较大,长10—15厘米,幼果有贴伏微柔毛。

产四川。生于灌木林中,海拔2200—2500米。

组2. 木姜子组——Sect. *Litsea*——*Tetranthera* sect. *Glabraria* Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 372. 1851; Meissn. in DC. Prodr. 15 (1): 177. 1863.——*Litsea* sect. *Eulitsea* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 161. 1883; Fl. Brit. India 5: 157. 1886; Pax in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (2): 119. 1889.

常绿;叶互生,羽状脉;花被裂片很不完整或缺;花被筒在果时不增大或稍增大;雄蕊通常在12枚以上。

我国有1种。

15. 潺槁木姜子(海南植物志) 潺槁树,油槁树,胶樟,青野槁

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. in Philip. Journ. Sci. Bot. 6: 321. 1911; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 62. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 196. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 384. 1938; 广州植物志 92. t. 29 1956; 陈嵘,中国树木分类学 ed. 2, Suppl 25. 1957; 海南植物志 1: 291. f. 144. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 846. 图1692. 1972.——*Sebifera glutinosa* Lour. Fl. Cochinch. 638. 1790.——*Litsea sebifera* Pers. Syn. 2: 4. 1807.

15a. 潺槁木姜子(原变种)

var. *glutinosa*

常绿小乔木或乔木,高3—15米;树皮灰色或灰褐色,内皮有粘质。小枝灰褐色,幼时有灰黄色绒毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被灰黄色绒毛。叶互生,倒卵形、倒卵状长圆形或椭圆状披针形,长6.5—10(26)厘米,宽5—11厘米,先端钝或圆,基部楔形,钝或近圆,革质,幼时两面均有毛,老时上面仅中脉略有毛,下面有灰黄色绒毛或近于无毛,羽状脉,侧脉每边8—12条,直展,中、侧脉在叶上面微突,在下面突起;叶柄长1—2.6厘米,有灰黄色绒毛。伞形花序生于小枝上部叶腋,单生或几个生于短枝上,短枝长达2—4厘米或更长;每一年形花序梗长1—1.5厘米,均被灰黄色绒毛;苞片4;每一花序有花数朵;花梗被灰黄色绒毛;花被不完全或缺;能育雄蕊通常15,或更多,花丝长,有灰色柔毛,腺体有长柄,柄有毛;退化雌蕊椭圆,无毛;雌花中子房近于圆形,无毛,花柱粗大,柱头漏斗形;退化雄蕊有毛。果球形,直径约7毫米;果梗长5—6毫米,先端略增大。花期5—6月,果期