

产广东(鼎湖山)。生于山谷密林湿润处,海拔800—900米。

本种近似豺皮樟 *L. rotundifolia* Hemsl. var. *longifolia* (Nees) Allen, 但小枝、叶片两面、叶柄均无毛;雄花中无退化雌蕊;果椭圆形;果托杯状;果梗长约4毫米,易于区别。

40. 湖南木姜子 图版81: 7—8

*Litsea humanensis* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 53, f. 12. 1978.

常绿小乔木,高5米;树皮褐色,平滑,条状剥裂。小枝纤细,褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生或于枝顶呈簇生状,倒卵状披针形或披针形,长5—7厘米,宽1—2.5厘米,先端短突尖或渐尖,基部楔形或尖锐,薄革质,上面绿色,下面粉绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边6—9条,极纤细,两面均突起,并有明显的网脉,中脉在叶上面下陷,在下面突起;叶柄纤细,长5—6毫米,无毛。果序伞形,生于枝顶叶腋;总梗极短或几无总梗;苞片在结果时仍宿存,外面有短柔毛。果椭圆形,长约1.1厘米,直径6—7毫米;果托盘状,深1.5毫米,直径4—5毫米,全缘或分裂,有柔毛;果梗短,长1—2毫米,先端增粗,有灰黄色柔毛。果期4—5月。

产湖南南部。生于山地密林中。

41. 广东木姜子

*Litsea kwangtungensis* H. T. Chang 中山大学学报,生物科学专号 1960 (1), 26. 1960.

常绿灌木,高1.5—3米。幼枝灰褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生,长圆形或窄长圆形,长4—11.5厘米,宽1—3厘米,先端略尖或钝,基部楔形,革质,上面深绿色,有光泽,下面黄绿色,两面均无毛。羽状脉,中脉在叶上面平或微陷,在下面突起,侧脉每边6—9条,纤细,在叶上面稍明显,在下面稍突起;叶柄长5—7毫米,无毛。伞形花序单生于叶腋,花序总梗极短,略被短柔毛;每一花序有花3—4朵。果椭圆形,长7—8毫米;果托杯状,深3—4毫米,直径4—5毫米,外面略被微柔毛;果梗长约3毫米,略被微柔毛。果期11月。

产广东(从化、增城、龙门)。生于山地密林中,海拔1000米以下。

42. 兰屿木姜子(台湾木本植物志,台湾植物志)

*Litsea garciae* Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. 228. 1886; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 216. 1963; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 439. 1976.——*Litsea kawakamii* Hay. Icon. Pl. Formos. 3: 165. 1913.——*Tetradenia kawakamii* (Hay.) Nemoto ex Makino et Nemoto Fl. Jap. ed 2, 374. 1931.——*Cyliodaphne garciae* (Vidal) Nakai in Bull. Tokyo Sci. Mus. 22: 32. 1948; 刘业经,台湾木本植物志 163. 1972.

常绿乔木。小枝粗壮,近于无毛。叶互生,卵状披针形或倒卵状披针形至披针形,长25—40厘米,宽6—15厘米,先端钝,基部楔形至狭楔形,薄革质,两面均无毛,上面绿色,下面苍绿色,羽状脉,侧脉每边16—20条,直展,纤细,在上面微突,在下面突起,中脉在叶上面扁平,较粗大,近叶基部处宽达4毫米,在下面突起,网脉在两面突起;叶柄粗壮,长1.5—2.5厘米,有沟槽,无毛。伞形花序,花梗粗壮。花未见。果扁球形,长2.2厘米,直径约3厘米,成熟时桔红色;果托杯状,深约7毫米,直径约3厘米;果梗长1.5厘米。果期8—9月。

产我国台湾(兰屿、花莲、台北)。生于常绿阔叶林中。菲律宾也有分布。

43. 栓皮木姜子 图版 86: 4

*Litsea suberosa* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 54. 1978.

常绿小乔木,高5米;树皮灰色或灰褐色。幼枝灰黄色,无毛或有稀疏毛,老枝灰白色,无毛,具薄的木栓质皮层,皮孔显著。顶芽卵圆形,鳞片外被丝状短柔毛。叶互生,倒披针形或狭长椭圆形,长6—17厘米,宽1.5—5厘米,先端突尖,基部楔形,革质或薄革质,上面深绿色,无毛,下面浅绿色,沿脉有稀疏长柔毛或无毛,羽状脉,侧脉每边13—15条,中脉、侧脉在叶上面平或微陷,在下面突起,小脉稍突起;叶柄长5—1.5毫米,无毛或仅于上面两侧有稀疏柔毛。伞形花序腋生,无总梗或有极短的总梗;苞片4,外面有灰色丝状短柔毛,每一雄花序有花5朵;花梗长2毫米,有丝状柔毛;花被裂片6,卵圆形,外面有丝状柔毛,内面无毛;能育雄蕊9,花丝有长柔毛;腺体小,圆形;无退化雌蕊。果椭圆形,长1—1.2厘米;果托杯状;果梗长3—4毫米,幼时果托外面与果梗均被柔毛。花期7—9月,果期10—11月。

产广东北部、湖南、湖北西部、四川(南川)。生于山坡林中或灌丛中,海拔800—1500米。

本种近黄丹木姜子 *L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook, f., 但幼枝灰黄色,无毛或有稀疏毛,老枝灰白色,无毛,具木栓质皮层,有皮孔,叶下面沿脉有稀疏柔毛或无毛,小脉稍突起,叶柄无毛或有稀疏长柔毛。

44. 大果木姜子(海南植物志) 毛丹母、青吐木(广东尖峰岭),青吐八角、八角带(海南吊罗山),假檬果 图版 82: 1

*Litsea lancilimba* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 244. 1923; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 176. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 379. 1938; 海南植物志 1: 290. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 844. 图 1688. 1972.

常绿乔木,高达20米,胸径达60厘米。小枝红褐色,粗壮,具明显棱条,无毛。顶芽卵圆形,先端钝,鳞片外面被丝状短柔毛,边缘无毛。叶互生,披针形,长10—20(50)厘米,宽3.5—5厘米,先端急尖或渐尖,基部楔形,革质,上面深绿色,有光泽,下面粉绿,两