

鳞片外面被锈色柔毛,边缘无毛。叶互生或聚生枝顶,披针形、倒披针形或长圆状披针形,长4—11厘米,宽2—4厘米,先端急尖或短渐尖,基部楔形,革质,上面幼时沿中脉有毛,其余无毛,下面有黄褐色短柔毛,沿叶脉毛较密,羽状脉,侧脉每边9—10条,中脉、侧脉在叶上面均下陷,在下面突起,横脉在叶下面明显突起,与侧脉几垂直相联;叶柄长0.6—1.2厘米,初时密被黄褐色柔毛,老时毛脱落至近于无毛。伞形花序生于当年生枝上端,簇生;总梗长约3毫米,有柔毛;每一花序有花5—6朵;花梗密被柔毛;花被裂片6,长椭圆形,长约2毫米,外面中肋有柔毛;能育雄蕊9,花丝有毛,腺体盾形;退化雌蕊细小;雌花中子房卵形,长约1毫米,近于无毛;花柱长2.5毫米;柱头2裂;退化雄蕊有毛。果椭圆形,长1.2—2厘米,直径1—1.2厘米,成熟时黑色;果托杯状,深3—4毫米,直径约5毫米;果梗长约1厘米。花期7—8月,果期12月至翌年2月。

产台湾、福建、广东、广西。生于山地密林中,海拔500—2500米。中南半岛东部也有分布。

64. 黄丹木姜子(海南植物志) 毛丹、红由、毛丹公(广东海南),野枇杷木(广东乐昌),打色眼树(广东增城),黄壳兰(广西大明山),长叶木姜子

*Litsea elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 163 (in nota sub *Lindera*) 1880; Hook. f. Fl. Brit. India 5: 165. 1886; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, 1(5): 62. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 195. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 390. 1938; 海南植物志 1: 294. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 846. 图1691. 1972.——*Tetranthera elongata* Wall. list. No. 2546. 1830, nomen nudum.——*Daphnidium elongata* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 63. 1831.

64a. 黄丹木姜子(原变种) 图版86: 1

var. *elongata*

常绿小乔木或中乔木,高达12米,胸径达40厘米;树皮灰黄色或褐色。小枝黄褐至灰褐色,密被褐色绒毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生,长圆形、长圆状披针形至倒披针形,长6—22厘米,宽2—6厘米,先端钝或短渐尖,基部楔形或近圆,革质,上面无毛,下面被短柔毛,沿中脉及侧脉有长柔毛,羽状脉,侧脉每边10—20条,中脉及侧脉在叶上面平或稍下陷,在下面突起,横行小脉在下面明显突起,网脉稍突起;叶柄长1—2.5厘米,密被褐色绒毛。伞形花序单生,少簇生;总梗通常较粗短,长2—5毫米,密被褐色绒毛;每一花序有花4—5朵;花梗被丝状长柔毛;花被裂片6,卵形,外面中肋有丝状长柔毛;雄花中能育雄蕊9—12,花丝有长柔毛;腺体圆形,无柄;退化雌蕊细小,无毛;雌花序较雄花序略小,子房卵圆形,无毛,花柱粗壮,柱头盘状;退化雄蕊细小,基部有柔毛。果长圆形,长11—13毫米,直径7—8毫米,成熟时黑紫色;果托杯状,深约2毫米,直径约5毫米;果梗长2—3毫米。花期5—11月,果期2—6月。