

Capparis acuminata Lindl. (1830) 是 *C. acuminata* Willd. (1799) 的晚出同名, 必须废弃。Jacobs (1965) 建议用 *Capparis acutifolia* Sweet (1830) 为其代替名, 这是正确的, 但他将这个种任意扩大的概念我们未采用。

Lindley (1830) 的描述及彩色图 (即本种模式) 是根据 J. Reeves 自广东沿海引于英国伦敦栽培材料所作, 这种植物 1828 年在伦敦第一次开花。Lindley 的图上及描述中, 花均是单出腋生, 这种现象在原产地是很少见的。

6. 薄叶山柑 (云南植物志)

Capparis tenera Dalz. in Hook., Journ. Bot. Kew Misc. 2: 41. 1850; Hook. f. et Thoms. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1: 179. 1872; Gagn., Fl. Gén. Indo-Chin. 1: 183. 1908; Jacobs in Blumea 12 (3): 497. 1965; 云南植物志 2: 54. 1979; 中国高等植物图鉴补编 1: 701. 1982, in clavi. — *Capparis tenera* Dalz. var. *dalzellii* Hook. f. et Thoms. Fl. Brit. Ind. 1: 179. 1872.

灌木或藤本植物, 高 3 米。新生枝无毛或被短绒毛立即变无毛; 刺长 3—4 毫米, 尖利, 外弯, 但在小枝上细小常上举或微内弯。叶椭圆形、卵形或倒卵形, 草质至近革质, 长 4—7 厘米, 宽 1.8—4 厘米, 长约为宽的 1.8—2.3 倍, 基部急尖至近圆形, 顶端锐尖或亚渐尖, 尖头长 3—7 (—10) 毫米, 中脉较细, 表面中部以下浅凹 (果期时的叶未见), 侧脉 4—6 对, 网状脉稍明显; 叶柄纤细, 长 3—5 毫米。花 (1—) 2—3 朵排成一短纵列, 腋上生; 花梗长 1.5—2.5 厘米, 纤细, 无毛; 萼片外面无毛, 内面及边缘有时被毛, 长 4—5 毫米, 宽 2—3 毫米, 外轮稍宽, 卵形, 稍内凹, 内轮略狭, 椭圆形, 顶端急尖或钝形; 花瓣白色, 上面 1 对稍宽略短, 近基部红色, 下面 1 对稍长略狭长 4—7 毫米, 宽约 2 毫米, 内外均被绒毛; 雄蕊 14—18 (—21), 有时更少; 雌蕊柄长 1.5—2.5 厘米, 丝状, 无毛; 子房梨形, 长 1—1.5 毫米, 1 室, 胎座 2, 胚珠数个; 花柱与柱头不分明, 小丘状。成熟果未见。据文献所载, 浆果球形, 直径 7—10 毫米, 很少具短尖头, 成熟时红色, 果时花梗与雌蕊柄均不增粗; 种子 1—2 (—4) 粒。花期 2—4 月, 果期不详。

产云南西部 (盈江、瑞丽、镇康、耿马), 生于山坡寨旁、山脚疏林中, 海拔可达 1 250 米。泰国、缅甸、锡金、印度东北部及西海岸至非洲都有。

7. 小绿刺 (云南植物志) 图版 124

Capparis urophylla F. Chun in Journ. Arn. Arb. 29: 419. 1948; Jacobs in Blumea 12 (3): 501. 1965; 云南植物志 2: 54, 图版 15: 8—10, 1979; 中国高等植物图鉴补编 1: 702. 1982, in clavi. — *Capparis cuspidata* B. S. Sun in Act. Phytotax. Sin. 9 (2): 111. 1964. — *Capparis tenera* Dalz. var. *caudata* B. S. Sun in Act. Phytot. Sin. 9 (2): 111. 1964.

小乔木或灌木, 高 2—7 米。树皮黑色, 有长圆形或线形淡黄白色皮孔; 新生枝无