

毛或有极细浅褐色星状毛，后变无毛；小枝圆柱形，纤细，干后绿色或黄绿色，有纵行细条纹，无刺或有长约1毫米上举微内弯的小刺；茎上刺粗壮，长达5毫米，基部膨大，直或微外弯。叶卵形或椭圆形，幼时膜质，老时草质，基部圆形或急尖，顶端渐狭延成长尾，连尾长3—7厘米；尾长(1—)1.5—2.5厘米，中部宽约2毫米，镰弯或直；中脉表面微凹成细沟或与叶面平齐，背面凸起，网状脉不明显；叶柄纤细，长3—5毫米。花单出腋生或2—3朵排成一短纵列腋生；花梗长6—12(—15)毫米；萼片长3—5毫米，宽2—3毫米，外面无毛，边缘及内面有绒毛，外轮卵形，近轴萼片基部浅囊状，内轮椭圆形；花瓣白色，外面近无毛，内有绒毛，长6—7毫米，宽3—4毫米，上面1对卵形，相邻一侧中部以下彼此贴合，基部向外反折，下面1对椭圆形，分离；雄蕊12—20；雌蕊柄长1.4—2.5厘米，丝状，无毛；子房长约1毫米，无毛，1室，胎座2。果球形，直径6—10毫米，成熟后桔红色，表面近平滑；花梗与雌蕊柄果时均不增粗。种子1—2粒。花期3—6月，果期8—12月。

产广西及云南西南部至东南部，生于山坡道旁、河旁或溪边、山谷疏林或石山灌丛，海拔可达1850米。老挝北部也有。模式标本采自广西兴安县老虎山。

8. 无柄山柑 (植物分类学报) 图版 125

Capparis subsessilis B. S. Sun in Act. Phytotax. Sin. 9 (2): 110. 1964; 中国高等植物图鉴补编 1: 702. 1982, in clavi.

灌木，高3米。小枝圆形，干后淡绿色，较纤细，基部周围无钻形苞片状小鳞片，无毛，无刺或有细小而上举的小刺。叶无柄或近无柄，椭圆形或微倒卵状椭圆形，纸质，长9—12.5厘米，宽3.5—5厘米，长约为宽的2.5倍，最宽在叶片中部或有时在略上，顶端渐尖至长渐尖，尖头最长达1.8厘米，常有自中脉延伸的小凸尖头，基部心形，鲜时表面深绿色，背面浅绿色，干后草黄色，两面无毛，中脉与侧脉在表面均凹入，背面均凸起，侧脉9—11对，在远离叶缘前即弧弯网结，网状脉疏散，在表面下凹或近平坦，背面凸起。花未见。花梗果时长2—3厘米，纤细，无毛；雌蕊柄果时长2.5—3.8厘米，纤细，无毛。果单生，腋生，青绿色(或未完全成熟)，近球形，略偏斜，直径8—9毫米，干后表面有细粒状小疣点，果皮干后坚硬。种子1—2粒，肾形，直径6—7毫米，种皮平滑，淡红色。花期不详，果期8—10月。


广西西南部(龙州)特产，为海拔500米以下山谷密林或疏林中的少见植物。

与其他可以比较的种的区别点在于本种叶无柄，基部心形；中脉、侧脉及网状脉在表面均明显下凹。

果虽单生腋生，但果梗基部在向下靠近叶腋的部位尚可见有花梗脱落后疤痕，由此可知本种在花期时是数花连续着生的，不是花单出腋生的。

9. 多花山柑 (云南植物志)

Capparis multiflora Hook. f. et Thoms. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 1: 178.



图版 125 无柄山柑 *Capparis subsessilis* B. S. Sun: 1. 果枝, 2. 成熟果, 3. 叶表面, 4. 叶背面。
(张瀚文绘)