

未达完全成熟);花梗与雌蕊柄在果时均稍增粗。种子扁平,1至数粒,长约7毫米。花期3月,果期7月。

海南特有,生于低海拔沙质土壤的灌丛或森林中。模式标本采自海南琼中。

原记载“雄蕊15个”、“花瓣5个”;《海南植物志》又记载“萼片2片”,经检查模式标本,上述情况均未见。

18. 英蕊叶山柑 (云南植物志)

Capparis viburnifolia Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. **85**: 598. 1939; Gagn., Fl. Gen. Indo-Chin. Suppl. **1**: 168. 1939; Jacobs in Blumea **12** (3): 505. 1965, excl. spec. Wang 73796; 云南植物志 **2**: 58, 图版 16: 1—2. 1979; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 703. 1982. in clavi.

灌木或木质藤本。新生枝密被锈色长柔毛,小枝粗壮,有棱角,很晚才变无毛;刺粗壮,常外弯,长2—5毫米,中部以下有与枝相同的被毛。叶革质,椭圆形或长圆形,有时卵形或倒卵形,长5—9厘米,宽(2.5—)3—5厘米,顶端突然渐尖,尖头长2—8毫米,基部钝形至亚心形,表面暗绿色,除中脉之外几变无毛,背面密被锈色长柔毛,干后边缘多向外反卷,中脉表面近平齐至浅凹,背面凸起,侧脉5—7对,表面渐向叶缘渐下凹,背面凸起,网状脉表面稍明显略下凹,背面不明显;叶柄稍粗壮,长6—15毫米。花3—10朵在枝端集生成不具总花梗的伞房状花序,开放时直径约3—4厘米;花梗粗壮,长2—3厘米,直径约2毫米,被毛特别浓密;萼片长15毫米内外,宽6—10毫米,外轮特别内凹,几乎将内轮全部包着,革质,外面被极密的锈色长柔毛,内面无毛,内轮有膜质边缘;花瓣白色,长约2厘米,宽约1.5厘米,中部以下被白色柔毛,外面特别明显;雄蕊约75,花丝紫色或白色;雌蕊柄长2厘米以上,近基部有白色长柔毛;子房卵球形,长约3毫米,表面光滑无毛,1室,胎座4,胚珠多数。成熟果未见。花期2—3月,果期不详。

产云南南部,生于开旷无荫干燥处,海拔可达1300米。越南北部至中部也有。

Jacobs (Blumea **12** (3): 509. 1965)把果实表面密被茸毛的标本鉴定为本种,我们认为他的作法是不妥当的,理由是本种的子房在花期时光滑无毛,看来不可能在长成果时被毛。此外毛果山柑与本种很相近,主要区别点是那个种的果实密被茸毛,被 Jacobs 鉴定为本种的有毛果的标本亦应属于毛果山柑为妥。

19. 毛果山柑 (植物分类学报) 图版 127

Capparis trichocarpa B. S. Sun in Act. Phytot. Sin. **9**: 113. 1964; 云南植物志 **2**: 58, 图版 17: 2. 1979; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 703. 1982, in clavi.

藤本植物,全体被红锈色短绒毛。小枝略细,直径2.5—3.5毫米,枝圆柱形,粗壮,直径约1厘米,带灰色;刺粗壮,外弯成钩状,长达4毫米,至少在中部以下密被绒毛。叶椭圆形,有时倒卵形,革质,表面无光泽,被短绒毛或长成时近无毛,背面密