

外被锈色短柔毛，内面无毛，内轮倒卵形，无毛；花瓣长圆形，长8—9毫米，宽约3毫米，除基部边缘有纤毛外无毛；雄蕊35—39；雌蕊柄长15—20毫米，无毛，果时木化增粗，直径2—3毫米；子房卵球形，长约2毫米，直径约1.5毫米，胎座4，胚珠多数。果球形，表面平滑，成熟后紫黑色，直径1.5—4厘米。种子7—9粒或更多，长约10毫米，宽约8毫米，高约5毫米，种皮平滑，赤褐色。花期3—5月，果期11—12月。

产广西西部至北部、云南东南部，生于海拔1000米以下的石山灌丛或林中。模式标本采自广西凤山县。

广西德保曾有果“入药，但有毒，人吃能致死”的记载。

与马槟榔相近，其区别点在于本种叶常为倒卵形，长成时两面无毛；花枝上刺粗壮，花序下部在数花花梗基部有一对黄色小刺；果实表面平滑，顶端无喙。

27. 兰屿山柑 (台湾植物志)

Capparis lanceolaris DC. Prodr. 1: 248. 1829; Miq., Fl. Ind. Bat. 1 (2): 101. 1858; Jacobs in Fl. Mal. I. 6: 77, f. 11. 1960; Jacobs in Blumea 12 (3): 459. 1965; 台湾植物志 2: 666. 1976; 2nd. ed. 2: 735, photo 325. 1996.

攀援或蔓性灌木，高约1.5米。小枝大都悬垂，不具鳞片，常具刺；刺向下弯，长达0.7厘米，被平贴毛。叶革质，长圆形，长5—15厘米，宽2—6厘米，两面光滑无毛，但背面常有黄棕色微柔毛，先端渐尖，稀圆形或微缺，但常为急尖而具小凸尖头，基部圆形，稀近心形，边缘常外弯，中脉在叶面下凹，稀与叶面平齐，侧脉6—10对，几乎不明显；叶柄长1.5—2.7厘米。花5朵，成亚伞形花序，大多腋生，稀顶生；花梗长1.5—2.7厘米，无毛，基部有1对刺；花白色、淡黄色、粉红色或红色，稀灰绿色；萼片长0.6—0.7厘米，宽0.5厘米，边缘膜质，无毛，外面1对草质，内面1对扁平而质地较薄，稀有小纤毛，在芽内时分离；花瓣倒卵形，长0.8—1.1厘米，宽0.4—0.6厘米，基部多毛；雄蕊20（—40），长2—3厘米；雌蕊柄长2—4.5厘米；子房椭圆形，长0.1—0.2厘米，无毛，胎座3—4。浆果少数，亚球形至球形，长2.3—3.5厘米，径2—3.2厘米，淡蓝黑色。种子3枚或更多，长0.8—1.2厘米，宽0.5—1.2厘米。

产台湾省（兰屿），生于灌丛或石灰质多石块的土壤上。菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚也有。

标本未见，上文摘自《台湾植物志》第2卷。我国台湾为本分布区的北界是可能的，但过去没有报道过。

本种与野槟榔 *Capparis chingiana* B. S. Sun、低头鸡 *Capparis versicolor* Griff. 及屏边山柑 *Capparis khuamak* Gagn. 都相近，由于未见标本，关于它们之间再进一步的性状比较就无法作出。因而在种检索表中，因其花序中有刺，只好将它同野槟榔并列在一起

了。

28. 屈头鸡 (广东) 图版 130

Capparis versicolor Griff., Notul. Pl. As. **4**: 577. 1845; Hook. f. et. Thoms. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **1**: 175. 1872; Kurz, For. Fl. Burma **1**: 65. 1877; Jacobs Fl. Mal. I. **6**: 93. 1960; Jacobs in Blumea **12** (3): 501, f. 32. 1965; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 77, 图 8763. 1982. — *Capparis koi* Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**: 28. 1934; 植物分类学报 **7** (1): 5. 1958; 海南植物志 **1**: 349. 1964. — *Capparis khuamak* Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. **85**: 598. 1939, p. p.; Gagn., Fl. Gén. Indo-Chin. Suppl. **1**: 167, f. 15. 1939.

灌木或藤本植物，高 2—10 米，胸径 4—6 厘米。新生枝被褐色短柔毛，后变无毛，但在叶柄及节上始终可见残存被毛；刺粗壮，平展或稍外弯，尖端黑色，有时只有乳头状突起或无刺。叶亚革质，椭圆形或长圆状椭圆形，长 3.5—8 厘米，宽 1.5—3.5 厘米，顶端急尖或钝形，常微缺，基部急尖，中脉表面狭而下凹，背面淡黄色，凸起，侧脉 6—9 对，表面稍明显，背面近消失，网状脉疏散，不明显；叶柄长 5—9 毫米。亚伞形花序腋生及（或）顶生，有花 2—5 朵；总花梗粗壮，长数毫米至 5 厘米，常有棱角，顶端常有（1—）2（—3）片败育的小型叶，有时单花腋生而有较长的花梗；花梗长 1.5—3 厘米，粗壮；花芳香，白色或粉红色；萼片长 9—11 毫米，宽 8—10 毫米，无毛，外轮内凹成舟形，近圆形，内轮椭圆形；花瓣近圆形至倒卵形，长 12—17 毫米，宽 7—14 毫米，无毛或内面近基部被短柔毛；雄蕊 50—70，花丝长约 2.5 厘米，花药长圆形，长约 2 毫米；雌蕊柄长 3—5 厘米，丝状，无毛；子房椭圆形，无毛，长约 2 毫米，直径 1.5 毫米，胎座 4，胚珠多数。果球形，直径 3—5 厘米，成熟时黑色，表面粗糙，有时有少数节状或疣状的突起；果皮干后坚硬，厚 2—3 毫米；花梗及雌蕊柄果时木化增粗，直径 3—5 毫米。种子大，近多角形，长 17—24 毫米，宽 12—15 毫米，高 9—12 毫米。花期 4—7 月，果期 8 月到次年 2 月。

产广东、广西，喜生于海拔 200—2 000 米稍干燥砂质土壤的疏林或灌丛中。印度东北部（阿萨姆为原产地）、缅甸、中南半岛也有。

果入药，性味甘、凉，有疗肺止咳、生津利喉、解毒清肝之效；根亦入药，敷跌打损伤。广东有的药店收购，药名屈头鸡。

29. 文山山柑 (云南植物志) 图版 131

Capparis fengii B. S. Sun in Act. Phytot. Sin. **9**: 112. 1964; 云南植物志 **2**: 67, 图版 20. 1979; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 704. 1982, in clavi.

攀援灌木，高达 10 米，除花瓣外全体光滑无毛。新生枝有明显的棱和槽，干后黄褐色，枝近圆柱形，暗褐色，髓部白色；小枝上刺呈黄色半球形突起，枝上刺粗壮，长 2—3 毫米，外弯。叶长圆状披针形，长 9—12 厘米，宽 3—4 厘米，长成时坚纸质，干