

了。

28. 屈头鸡 (广东) 图版 130

Capparis versicolor Griff., Notul. Pl. As. **4**: 577. 1845; Hook. f. et. Thoms. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **1**: 175. 1872; Kurz, For. Fl. Burma **1**: 65. 1877; Jacobs Fl. Mal. I. **6**: 93. 1960; Jacobs in Blumea **12** (3): 501, f. 32. 1965; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 77, 图 8763. 1982. — *Capparis koi* Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**: 28. 1934; 植物分类学报 **7** (1): 5. 1958; 海南植物志 **1**: 349. 1964. — *Capparis khuamak* Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. **85**: 598. 1939, p. p.; Gagn., Fl. Gén. Indo-Chin. Suppl. **1**: 167, f. 15. 1939.

灌木或藤本植物, 高 2—10 米, 胸径 4—6 厘米。新生枝被褐色短柔毛, 后变无毛, 但在叶柄及节上始终可见残存被毛; 刺粗壮, 平展或稍外弯, 尖端黑色, 有时只有乳头状突起或无刺。叶亚革质, 椭圆形或长圆状椭圆形, 长 3.5—8 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米, 顶端急尖或钝形, 常微缺, 基部急尖, 中脉表面狭而下凹, 背面淡黄色, 凸起, 侧脉 6—9 对, 表面稍明显, 背面近消失, 网状脉疏散, 不明显; 叶柄长 5—9 毫米。亚伞形花序腋生及 (或) 顶生, 有花 2—5 朵; 总花梗粗壮, 长数毫米至 5 厘米, 常有棱角, 顶端常有 (1—) 2 (—3) 片败育的小型叶, 有时单花腋生而有较长的花梗; 花梗长 1.5—3 厘米, 粗壮; 花芳香, 白色或粉红色; 萼片长 9—11 毫米, 宽 8—10 毫米, 无毛, 外轮内凹成舟形, 近圆形, 内轮椭圆形; 花瓣近圆形至倒卵形, 长 12—17 毫米, 宽 7—14 毫米, 无毛或内面近基部被短柔毛; 雄蕊 50—70, 花丝长约 2.5 厘米, 花药长圆形, 长约 2 毫米; 雌蕊柄长 3—5 厘米, 丝状, 无毛; 子房椭圆形, 无毛, 长约 2 毫米, 直径 1.5 毫米, 胎座 4, 胚珠多数。果球形, 直径 3—5 厘米, 成熟时黑色, 表面粗糙, 有时有少数节状或疣状的突起; 果皮干后坚硬, 厚 2—3 毫米; 花梗及雌蕊柄果时木化增粗, 直径 3—5 毫米。种子大, 近多角形, 长 17—24 毫米, 宽 12—15 毫米, 高 9—12 毫米。 花期 4—7 月, 果期 8 月到次年 2 月。

产广东、广西, 喜生于海拔 200—2 000 米稍干燥砂质土壤的疏林或灌丛中。印度东北部 (阿萨姆为原产地)、缅甸、中南半岛也有。

果入药, 性味甘、凉, 有疗肺止咳、生津利喉、解毒清肝之效; 根亦入药, 敷跌打损伤。广东有的药店收购, 药名屈头鸡。

29. 文山山柑 (云南植物志) 图版 131

Capparis fengii B. S. Sun in Act. Phytot. Sin. **9**: 112. 1964; 云南植物志 **2**: 67, 图版 20. 1979; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 704. 1982, in clavi.

攀援灌木, 高达 10 米, 除花瓣外全体光滑无毛。新生枝有明显的棱和槽, 干后黄褐色, 枝近圆柱形, 暗褐色, 髓部白色; 小枝上刺呈黄色半球形突起, 枝上刺粗壮, 长 2—3 毫米, 外弯。叶长圆状披针形, 长 9—12 厘米, 宽 3—4 厘米, 长成时坚纸质, 干



图版 130 屈头鸡 *Capparis versicolor* Griff.: 1. 花枝, 2. 果枝。(张瀚文绘)