

菜(内蒙古)、疙瘩白、大头菜(东北)、包心菜、包包菜(陕西)、莲花白(四川、云南)、椰菜(广东,广西) 图版 2: 3—4。

Brassica oleracea* var. *capitata L. Sp. Pl. 667. 1753; O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. **70** (4. 105): 31. pl. 11. f. E. 1919; L.H. Bailey in Gent. Herb. **1**: 78. 1922 et **2**: 226. f. 112. 1930; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sinica **2**(3): 180. 1948; 广州植物志 112. 1956; 中国高等植物图鉴 **2**: 30. 图 1790. 1972; 秦岭植物志 **1**(2): 398. 1974; 内蒙古植物志 **2**: 337. 图版 178, 图 1—3. 1978; 湖北植物志 **2**: 37. 图 729. 1979; 东北草本植物志 **4**: 39. 图版 21. 1980. — *B. capitata* Lévl. in Pl. Monde Pl. **12**: 24. 1910.

二年生草本, 被粉霜。矮且粗壮一年生茎肉质, 不分枝, 绿色或灰绿色。基生叶多数, 质厚, 层层包裹成球状体, 扁球形, 直径 10—30 厘米或更大, 乳白色或淡绿色; 二年生茎有分枝, 具茎生叶。基生叶及下部茎生叶长圆状倒卵形至圆形, 长和宽达 30 厘米。顶端圆形, 基部骤窄成极短有宽翅的叶柄, 边缘有波状不显明锯齿; 上部茎生叶卵形或长圆状卵形, 长 8—13.5 厘米, 宽 3.5—7 厘米, 基部抱茎; 最上部叶长圆形, 长约 4.5 厘米, 宽约 1 厘米, 抱茎。总状花序顶生及腋生; 花淡黄色, 直径 2—2.5 厘米; 花梗长 7—15 毫米; 萼片直立, 线状长圆形, 长 5—7 毫米; 花瓣宽椭圆状倒卵形或近圆形, 长 13—15 毫米, 脉纹显明, 顶端微缺, 基部骤变窄成爪, 爪长 5—7 毫米。长角果圆柱形, 长 6—9 厘米, 宽 4—5 毫米, 两侧稍压扁, 中脉突出, 喙圆锥形, 长 6—10 毫米; 果梗粗, 直立开展, 长 2.5—3.5 厘米。种子球形, 直径 1.5—2 毫米, 棕色。花期 4 月, 果期 5 月。

各地栽培, 作蔬菜及饲料用。叶的浓汁用于治疗胃及十二指肠溃疡。

1c. 花椰菜(广州植物志) 花菜(俗称)

Brassica oleracea* var. *botrytis L. Sp. Pl. 667. 1753; O. E. Schulz l. c. 32. pl. 12. 1919; L.H. Bailey l. c. **1**: 79. f. 28b. 1922 et **2**: 229. f. 113. 1930; T. Y. Cheo l. c. 181. 1948; 广州植物志 112. 1956; 中国高等植物图鉴 l. c. 30. 1972; 秦岭植物志 l. c. 398. 1974; 内蒙古植物志 l. c. 337. 图版 178, 图 4. 1978; 湖北植物志 l. c. 37. 1979; 东北草本植物志 l. c. 39. 图版 22. 1980.

二年生草本, 高 60—90 厘米, 被粉霜。茎直立, 粗壮, 有分枝。基生叶及下部叶长圆形至椭圆形, 长 2—3.5 厘米, 灰绿色, 顶端圆形, 开展, 不卷心, 全缘或具细牙齿, 有时叶片下延, 具数个裂片, 并成翅状; 叶柄长 2—3 厘米; 茎中上部叶较小且无柄, 长圆形至披针形, 抱茎。茎顶端有 1 个由总花梗、花梗和未发育的花芽密集成的乳白色肉质头状体; 总状花序顶生及腋生; 花淡黄色, 后变成白色。长角果圆柱形, 长 3—4 厘米, 有 1 中脉, 喙下部粗上部细, 长 10—12 毫米。种子宽椭圆形, 长近 2 毫米, 棕色。花期 4 月, 果期 5 月。

各地栽培。头状体作蔬菜食用。