

绿色至黄色;花瓣倒卵形,长7—8毫米,基部渐窄成爪。长角果较粗短,长3—6厘米,宽约3毫米,两侧压扁,直立,喙长4—10毫米,宽约1毫米,顶端圆;果梗开展或上升,长2.5—3厘米,较粗。种子球形,直径1—1.5毫米,棕色。花期5月,果期6月。

原产我国华北,现各地广泛栽培。

为东北及华北冬、春季主要蔬菜。生食、炒食、盐腌、酱渍均可;外层脱落的叶可作饲料。

9. 塌棵菜(江苏南部种子植物手册) 瓢儿菜、塌古菜、乌塌菜(江苏) 图版6: 4—8

Brassica narinosa L. H. Bailey in Gent. Herb. 1:99. f. 44, 45. 1922 et 2:251. 1930; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3): 181. 1948; 江苏南部种子植物手册 316. 图 501. 1959; 中国高等植物图鉴 2:33. 图 1796. 1972——*B. chinensis* L. var. *rosularia* Tsen et Lee in Hortus Sinicus 2:8. 1942; 内蒙古植物志 2:329. 图版 174. 1978.

二年生或栽培成一年生草本,高30—40厘米,全株无毛,或基生叶下面偶有极疏生刺毛;根粗大,顶端有短根颈;茎丛生,上部有分枝。基生叶莲座状、圆卵形或倒卵形,长10—20厘米,墨绿色,有光泽,不裂或基部有1—2对不显著裂片,显著皱缩,全缘或有疏生圆齿,中脉宽,有纵条纹,侧脉扇形;叶柄白色,宽8—20毫米,稍有边缘,有时具小裂片;上部叶近圆形或长圆状卵形,长4—10厘米,全缘,抱茎。总状花序顶生;花淡黄色,直径6—8毫米;花梗长1—1.5厘米;萼片长圆形,长3—4毫米,顶端圆钝;花瓣倒卵形或近圆形,长5—7毫米,多脉纹,有短爪。长角果长圆形,长2—4厘米,宽4—5毫米,扁平,果瓣具显明中脉及网状侧脉;喙宽且粗,长4—8毫米;果梗粗壮,长1—1.5厘米,伸展或上部弯曲。种子球形,直径约1毫米,深棕色,有细网状窠穴,种脐显著。花期3—4月,果期5月。

我国原产,南京、上海一带栽培最多,为冬季主要蔬菜之一。

10. 青菜(通称) 小白菜(通称),油菜(东北),小油菜(经济植物手册)

Brassica chinensis L. Gent. Pl. 1: 19. 1755 et Amoen. Acad. 4:280. 1759; L. H. Bailey in Gent. Herb. 1: 99. f. 46. 47. 1922 et 2:25. f. 135. 136. 1930; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3): 181. 1948; 广州植物志 113. 1956; 江苏南部种子植物手册 318. 图 504. 1959; 北京植物志上册, 335. 图 281. 1962; 海南植物志 1: 355. 1964; 中国高等植物图鉴 2:34. 图 1797. 1972; 秦岭植物志 1(2):399. 1974; 湖北植物志 2:39. 图版 733. 1979; 东北草本植物志 4:50. 图版 28. 1980.——*B. napus* L. var. *chinensis* (L.) O. E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 70 (4. 105): 45. 1919.

10a. 青菜(原变种) 图版5: 1—4

Brassica chinensis var. *chinensis*

一年或二年生草本,高25—70厘米,无毛,带粉霜;根粗,坚硬,常成纺锤形块根,顶端常有短根颈;茎直立,有分枝。基生叶倒卵形或宽倒卵形,长20—30厘米,坚实,深绿色,有光泽,基部渐狭成宽柄,全缘或有不显明圆齿或波状齿,中脉白色,宽达1.5厘米,有多