

条纵脉;叶柄长3—5厘米,有或无窄边;下部茎生叶和基生叶相似,基部渐狭成叶柄;上部茎生叶倒卵形或椭圆形,长3—7厘米,宽1—3.5厘米,基部抱茎,宽展,两侧有垂耳,全缘,微带粉霜。总状花序顶生,呈圆锥状;花浅黄色,长约1厘米,授粉后长达1.5厘米;花梗细,和花等长或较短;萼片长圆形,长3—4毫米,直立开展,白色或黄色;花瓣长圆形,长约5毫米,顶端圆钝,有脉纹,具宽爪。长角果线形,长2—6厘米,宽3—4毫米,坚硬,无毛,果瓣有明显中脉及网结侧脉;喙顶端细,基部宽,长8—12毫米;果梗长8—30毫米。种子球形,直径1—1.5毫米,紫褐色,有蜂窝纹。花期4月,果期5月。

原产亚洲。我国南北各省栽培,尤以长江流域为广。

嫩叶供蔬菜用,为我国最普遍蔬菜之一。

10b. 油白菜(变种) 白菜型油菜

Brassica chinensis* var. *oleifera Makino et Nemoto, Fl. Jap. 2nd. ed. 393. 1931;
内蒙古植物志 2: 329.图版 173.1978.

基生叶倒卵形,全缘或有不显明钝齿,幼时有单毛。

长江以南地区多有栽培。

种子榨油供食用。

11. 菜苔(广州植物志)

Brassica parachinensis L. H. Bailey in Gent. Herb. 1: 102. f. 48. 1922 et 2: 255. f. 137. 138. 1930; T. Y. Cheo l. c. 181.1948; 广州植物志 114.1956.

一年或二年生草本,高30—50厘米,全体无毛;茎直立或上升。基生叶长椭圆形或宽卵形,长6—8厘米,宽2—3厘米,顶端圆形,全缘,有宽中脉及显明侧脉;叶柄白色或绿色,长3—4.5厘米,稍具边缘;下部茎生叶和基生叶相似,宽卵形,叶柄无边缘,不抱茎;其他茎生叶卵形、披针形或窄长圆形,除顶部叶外皆有叶柄且不抱茎。其他和青菜相似。

各地栽培。模式标本采自亚洲东部。作蔬菜食用。

12. 芥菜疙瘩(北京) 芥菜、玉根(辽宁)

Brassica napiformis L. H. Bailey in Bull. Cornell Univ. Agr. Exp. Stat. 67:187. 1894. 1894 et in Gent. Herb. 1:83. f. 31. 32. 1922 et 2: 257. 1930; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3):181.1948; 北京植物志上册, 331.1962; 东北草本植物志 4: 45. 图版 25.1980.

二年生草本,高60—150厘米,全株无毛,稍有粉霜;块根圆锥形,直径7—10厘米,半在地上,外皮白色,根肉质,白色或黄色,有辣味,半在地下,两侧各有1条纵沟,在纵沟内生须根;茎直立,从基部分枝。基生叶少数,大头羽状浅裂,长10—20厘米,至少在幼时下面脉上及边缘有少数刺毛,顶裂片宽卵形,长达9厘米,顶端圆钝,边缘有不整齐尖齿,基部有2显明侧裂片及数个小裂片,疏生;叶柄长3—4.5厘米;茎生叶似基生叶,长5—12厘米;上部茎生叶长圆披针形,近全缘或全缘,无柄或稍抱茎。花浅黄色,直径7—8毫米;