

变种检索表

1. 块根肉质, 膨大 13d. 大头菜 var. *megarrhiza* Tsen et Lee
1. 根不为肉质, 也不膨大。
2. 全部叶形成多数线形或丝状裂片 13f. 多裂叶芥 var. *multisecta* L. H. Bailey
2. 叶不形成线形或丝状裂片。
3. 下部叶的叶柄基部肉质, 膨大, 成拳状; 基生叶倒卵形或长圆形, 大头羽状深裂 13c. 榨菜 var. *tumida* Tsen et Lee
3. 下部叶的叶柄基部不为肉质, 也不膨大。
4. 基生叶不分裂, 倒披针形或长圆状倒披针形, 边缘有不整齐锯齿或重锯齿 13b. 雪里蕻 var. *multiceps* Tsen et Lee
4. 基生叶大头羽裂或不分裂。
5. 叶不皱缩。
6. 基生叶宽卵形至倒卵形, 边缘有缺刻或裂齿 13a. 芥菜(原变种) var. *junceæ*
6. 基生叶长圆形或倒卵形, 边缘有重锯齿或缺刻 13e. 油芥菜 var. *gracilis* Tsen et Lee
5. 叶皱缩。
7. 基生叶及茎生叶具大裂片或狭长裂片, 边缘具尖齿或深缺刻成皱缩 13h. 皱叶芥 var. *crispifolia* L. H. Bailey
7. 基生叶及茎生叶大, 仅下部具裂片, 边缘具波状钝圆锯齿 13g. 大叶芥菜 var. *foliosa* L. H. Bailey

13b. 雪里蕻(通称) 雪里红、雪菜(江苏) 图版 5:9—10

Brassica juncea var. *multiceps* Tsen et Lee in Hortus Sinicus 2: 20. 1942; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3): 181. 1948. — *B. cernua* Forb. et Hemsl. var. *chirimenna* auct. non Makino; 北京植物志上册, 335. 1962. — *B. juncea* var. *crispifolia* auct. non L. H. Bailey; 中国高等植物图鉴 2: 32. 1979; 湖北植物志 2: 38. 1979.

基生叶倒披针形或长圆状倒披针形, 不裂或稍有缺刻, 有不整齐锯齿或重锯齿, 上部及顶部茎生叶小, 长圆形, 全缘, 皱缩。

我国南北各省栽培。模式标本采自浙江宁波。

盐腌作蔬菜食用。

13c. 榨菜(通称) 菱角菜、羊角儿菜(四川)

Brassica juncea var. *tumida* Tsen et Lee l. c. 23. 1942. — *B. juncea* var. *tsatsai* Mao nom. nud. in Hort. Sin. 2(8): 690. 1936.

下部叶的叶柄基部肉质, 膨大, 形成高低不平的拳状; 基生叶倒卵形或长圆形, 长40—80厘米, 平坦或皱缩, 基部大头羽状深裂, 成为具沟的粗叶柄。

四川省各县栽培, 尤以涪陵栽培最多; 云南也有栽培。榨菜的品种很多, 因其形态不同各有名称。模式标本采自四川涪陵。



1—4. 青菜 *Brassica chinensis*: L. var. *chinensis*: 1. 花、果枝, 2. 茎、叶, 3. 花, 4. 长角果。5—8. 擘蓝 *Brassica caulorapa* Pasq.: 5. 块茎, 6. 花、果枝; 7. 叶片, 8. 花。9—10. 雪里蕻 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. var. *multiceps* Tsen et Lee: 9. 花、果枝, 10. 花。(王金凤绘)