

1. 半脊荠(中国种子植物科属辞典)

Hemilophia pulchella Franch. Pl. Delav. 65. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 371. 1931.

1a. 半脊荠(原变种) 图版 18:4—5

Hemilophia pulchella Franch. var. **pulchella**

多年生草本，高 5—10 厘米；根茎多数，细长；茎铺散，外倾，无毛。叶倒卵状匙形，长 4—7 毫米，宽 1—2 毫米，顶端圆钝，基部楔形，全缘，无毛。花 2—3 朵生在近枝顶端的叶腋，直径 2—3 毫米；花梗长 3—4 毫米；萼片直立，紫色，卵形，长约 2 毫米；花瓣紫色，干燥后成蔷薇红色，倒卵形，长约 4 毫米，顶端 2 裂，基部楔形成短爪；花药紫色；子房微扁，花柱粗厚。短角果宽尖塔形，长 2—4 毫米，裂瓣长圆形，舟状，在中部以下沿边缘及背部有少数钝的小瘤状突起；果梗长 3—5 毫米。种子倒卵状长圆形，长约 1 毫米。花果期 7—8 月。

产云南(丽江)。生在海拔 3300—4000 米高山草坡。模式标本采自云南丽江。

变 种 检 索 表

1. 茎无毛..... 1a. 半脊荠(原变种) var. **pulchella**
1. 茎有毛。

2. 茎有微柔毛，花紫色..... 1b. 柔毛半脊荠 var. **pilosa** O. E. Schulz
2. 茎有卷曲短柔毛，花浅黄色..... 1c. 浅黄花半脊荠 var. **flavida** Hand.-Mazz.

1b. 柔毛半脊荠(变种)

Hemilophia pulchella var. **pilosa** O. E. Schulz in Fedde, Repert. Sp. Nov. 17: 290. 1921; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 3: 125. 1949.

茎有微柔毛，叶及萼片有显著糙伏毛；花紫色。

产云南(丽江)。生境同上。

1c. 浅黄花半脊荠(变种)

Hemilophia pulchella var. **flavida** Hand.-Mazz. in Anzeiger Wien 62: 24. 1925.
茎具卷曲短柔毛；花浅黄色，直径 9—12 毫米。

产四川(木里)。生在高山草坡，海拔 4700 米。

2. 小叶半脊荠

Hemilophia rockii O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9: 476. 1926;
Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 371. 1931. T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 3: 126. 1949.

和半脊荠相似，但植株较细；茎密生灰色卷曲短柔毛。叶较小，窄倒卵形或近长圆形，

长3—4毫米,宽1—1.5毫米,具细单毛。花较大,直径3—5毫米;萼片卵形,长约2毫米,有短柔毛;花瓣白色,向基部有浅紫纹;长雄蕊花丝基部齿状扩张,花药黄色。短角果长约3毫米。花、果期6月。

产四川(木里)。生在高山草坡,海拔3300—3900米。模式标本采自四川木里。

24. 蛇头芥属*——*Dipoma* Franch.

Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 404. 1886 et Pl. Delav. 63. t.

17A. 1889; O. E. Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2.

Aufl. 17b: 459. 1936.

多年生草本;根茎细,匍匐有分枝;茎多数,具单毛。基生叶莲座状,匙状卵形,全缘或上部有数个粗锯齿,无毛但有缘毛,具叶柄。总状花序花疏生,果期延长;花大;花梗短,有糙硬毛;萼片直立,卵形,具膜质边缘,基部不成囊状;花瓣白色,具紫色细纹,圆形,顶端凹缺;侧蜜腺半圆形,无中蜜腺;子房具4—6垂生胚珠,柱头头状,凹陷,不明显2裂,花柱短。短角果短卵形,压扁,开裂,果瓣膜质,凸出,有龙骨突起及细脉,隔膜宽。种子大,卵形,压扁,无边缘;子叶缘倚胚根。

2种、1变种、1变型,产我国西南部高山及甘肃。

本属模式种:蛇头芥 *Dipoma iberideum* Franch.

分 种 检 索 表

1. 叶倒卵形或倒披针形,长10—15毫米,宽2—4毫米;花药紫色;茎在花期长10—20厘米
..... 1. 蛇头芥 *D. iberideum* Franch.
1. 叶卵形或长圆状倒卵形,长约6毫米,宽约4毫米;花药黄色;茎在花期长3.4厘米
..... 2. 西藏蛇头芥 *D. tibeticum* O. E. Schulz

1. 蛇头芥

***Dipoma iberideum* Franch.** l. c. 404. 1886 et l. c. 63. t. 17A. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 372. 1931; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 3(3): 116. 1949; 中国高等植物图鉴 2: 43. 图 1815. 1972.

1a. 蛇头芥(原变种) 图版 18: 6—8

Dipoma iberideum* Franch. var. *iberideum

多年生草本;根茎细长,有分枝;茎外倾,不分枝或上部分枝,花期长10—20厘米,有

* 属的异名: 双果属(中国种子植物科属辞典)。