

产台湾北部。生低海拔至中海拔山坡。模式标本采自台湾。

11. 卵叶岩芥 图版 21: 1—3

Cochlearia paradoxa (Hance) O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 546. 1923.——*Cardamine paradoxa* Hance in Journ. Bot. 6: 111. 1868; Oliv. in Hook. Icon. Pl. 13: 66. t. 1285. 1879 et Ibid. 19. t. 1818. 1889.

一年生草本，高达1米，全株无毛；茎直立或上升，有棱。复叶有3小叶，极少有5小叶，顶生小叶卵形或卵状披针形，长1.8—4厘米，宽7—17毫米，顶端圆钝，具小短尖，基部楔形，边缘有数圆钝锯齿或弯缺，侧生小叶较小；叶柄长5—14毫米；小叶柄长1—5毫米。总状花序顶生及腋生，或成圆锥花序状；花白色，直径3—4毫米；花梗长4—7毫米；萼片长圆形，长约2毫米；花瓣长圆形，长约5毫米，顶端截形，基部渐狭。短角果卵形或倒卵形，长2—4毫米，宽1—2毫米，无毛或具极短乳突，网脉不显著；花柱短粗，长约1毫米；果梗长2—3毫米。种子2个，椭圆形，长约1毫米。花期4月，果期5月。

产湖北、湖南、广东、四川。生在山坡。模式标本采自广东。

12. 河岸岩芥

Cochlearia rivulorum (Dunn) O. E. Schulz, l. c. 8: 546. 1923.——*Nasturtium rivulorum* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 354. 1908.

一年生草本，疏松平铺，全株无毛。复叶具3小叶，下部小叶卵形，长3—5厘米，纸质，顶端圆钝，基部心形，边缘具弯缺，叶脉延伸；叶柄长5—6厘米；上部小叶相似但较大，具弯缺，有短的小叶柄。总状花序腋生，常超出叶；苞片1—2，心状卵形，长4—6厘米；花小，白色，彼此靠近；萼片及花瓣均长1.5—2毫米；子房卵形，扁平，花柱单一，比子房长3倍，柱头球形，胚珠约12，成2行。果实未见。

产福建(福州)、广东。生在小河的岸边树荫下。模式标本采自香港。

未见标本，从文献节译。

13. 武功山岩芥

Cochlearia hui O. E. Schulz, l. c. 8: 546. 1923.

一年生细小草本，高15—20厘米；茎多数，匍匐弯曲，分枝，无毛。基生叶具2对小叶，顶生小叶卵形或近心形，长1—2厘米，顶端微缺，具小短尖，边缘有不等大的圆钝齿，侧生小叶较小，短歪卵形，有短的小叶柄；叶柄长达3厘米；中部茎生叶有长1厘米的叶柄，具3小叶，顶生小叶卵形，常近圆裂，侧生小叶显著小；上部茎生叶为单叶，具极短叶柄。总状花序有花8—10朵，在花期疏生，约3朵生在苞片顶端；下部花梗长约1.5厘米，上部的长约2毫米；萼片长圆卵形，长约2毫米；花瓣白色或浅蔷薇色，倒卵状楔形，长约3毫米，顶端圆形。幼短角果椭圆形，长约1.5毫米；花柱长约1毫米，裂瓣有微小乳头。

产江西(安福武功山)。生在海拔1500米山坡石缝中。模式标本采自江西安福武功山。