

Erysimum schlagintweitianum O. E. Schulz in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **11**: 227. 1931; Jafri, Fl. West Pakist. **55**: 237. f. 30. 1 et t. 4. f. 35. 1973.

二年或多年生草本,高达10厘米。根茎单一,细长。茎直立,不分枝或少有从基部分枝,具2—4叉毛。基生叶密莲座状,叶片窄倒披针形,长20—30毫米,宽2—5毫米,边缘有波状齿,有柄或近无柄;茎生叶常为2—3个,叶片线形,较小,全缘,无柄。总状花序有10—20花,最下部花有时具苞片;花黄色,直径约5毫米;花梗长2—5毫米;萼片长4—6毫米;花瓣长8—10毫米;子房有多数胚珠,花柱长约1毫米,头状,柱头近2裂。未成熟长角果线形,近圆筒状,长约35毫米,宽约1毫米,具伏贴毛。

本种未见标本,从文献译录于此。

产西藏西部狮泉河。喜马拉雅山西部也有分布。模式标本采自喜马拉雅山西部。

本种极矮小,至今还没有采到成熟果实,很可能是山柳菊叶糖芥 *Erysimum hieracifolium* L. 的一个矮小类型。

5. 腋花糖芥

Erysimum schneideri O. E. Schulz in Fedde, Repert. **17**: 69. 1921 et in Engl. et Prantl, Nat. pflanzenfam. 2 Aufl. **17b**: 577. 1936.

多年生矮小草本,高达7厘米。茎具宿存枯萎叶柄,略为白色,被分叉毛。基生叶丛生,叶片长椭圆状卵形,长2—3厘米,宽1—2厘米,顶端钝形,边缘具不显著小牙齿及有时紫色,基部收缩与叶柄等长,两面密被贴生2叉毛或3叉毛。总状花序,腋生,有花约15朵,苞片长椭圆形;花梗长4—5毫米,直径1.5毫米,斜升或直立。长角果线形,长3.5—9厘米,宽3—4毫米,略压扁,顶端渐尖,花柱长1—1.5毫米,果瓣具中脉达顶端;隔膜白色,具小脉,并与中脉联结。种子每室1行,有8—10粒,种子长椭圆状椭圆形,长约4毫米,宽约2毫米,厚约0.5毫米,棕褐色,具线状条纹;子叶背倚胚根。

产云南丽江。生于山坡上,海拔4200米。未见标本。模式标本采自云南丽江。

组2. 无苞组——Sect. *Erysimum*

花黄色或桔黄色,极少数紫色,全部无苞片。(种6—17)

系1. 糖芥系——Ser. *Erysimum*

我国有11种。(种6—16)

6. 糖芥

Erysimum bungei (Kitag.) Kitag. in Journ. Jap. Bot. **25**: 43. 1950 et Neo-Lineam. Fl. Mansh. 334. 1979.——*Cheiranthus aurantiacus* Bunge in Mém. Sav. Étrang. Acad. Sci. St. Pétersb. **2**: 72. 1833; Franch. Pl. David. **1**: 32. 1884; Maxim. in Acta Hort. Pétrap. **11**: 54. 1889; O. E. Schulz in Acta Hort. Gothob. **1**: 157. 1924; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. **2** (3): 193. 1948. et 3: 113. 1949.——*E. aurantiacum*