

Eutrema deltoideum (Hook. f. et Thoms.) O. E. Schulz var. **grandiflorum** O. E. Schulz in Notizbl. 9: 476. 1926.

花梗长 6—10 毫米;萼片长 3—3.5 毫米;花瓣匙状倒卵形,长 6—7 毫米。

产云南。

7. 歪叶山蓴菜 图版 124: 4—6

Eutrema obliquum K. C. Kuan et Z. X. An, 西藏植物志 2: 399. 1985.

多年生草本,高约 4 厘米,无毛。根粗;茎常数枝丛生。叶大部基生,基生叶大,叶柄长 1—2 厘米,叶片卵圆形或长圆形,长 1—2 厘米,宽 6—12 毫米,顶端钝圆或钝尖,基部常歪斜,全缘;茎生叶叶柄短,向上渐短至无柄,叶片小,下部的椭圆形,向上渐窄小成宽条形。花序密集成头状,果期不伸长;花未见(记录为淡黄色)。长角果披针形,长 5—6 厘米,宽约 1 毫米;果瓣梢成龙骨状隆起,顶端渐尖,基部钝,中脉明显;隔膜膜质,于中下部穿孔。种子每室 1 粒,悬垂于室顶,种柄丝状。种子长圆形或卵状长圆形,长约 2 毫米,棕褐色。果期 9 月。

产西藏(比如县)。生山顶流石坡上,海拔 4900—5100 米。模式标本采自西藏。

组 2. 南山蓴菜组——Sect. **Wasabia** (Mats.) O. E. Schulz

O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 86(4, 105): 36. 1924.

我国有 3 种, 3 变种。(种 8—10)

8. 日本山蓴菜 小山蓴菜(台湾植物志)

Eutrema tenue Makino in Bot. Mag. Tokyo 26: 177. 1912.—*Wasabia tenuis* (Miq.) Matsum. in Fl. Jap. 2(2): 161. 1912; T. S. Liu et S.S. Ying in Hui-lin Li, Fl. Taiwan 2: 700. pl. 456. 1976.—*Eutrema wasabia* (Sieb.) Maxim. var. *tenue*(Miq.) O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 86(4, 105): 37. 1924.—*Wasabia bracteata* (S. Moore) Hisauchi in Journ. Jap. Bot. 12: 447. 1936;大井次三郎,日本植物志 573. 1956.

多年生草本,高 10—30 厘米,无毛。根茎细而短,其上有纤细的纤维根;茎直立。基生叶具柄;叶片肾圆形,长 2—5 厘米,基部心形,边缘具波状齿,脉掌状,脉端有小尖头;茎生叶卵圆形,长 1—2.5 厘米,宽 0.8—2.5 厘米,基部心形。总状花序疏松;花梗长 5—15 毫米,展开或反曲;花瓣白色,宽匙形,长 6—8 毫米。角果下垂,窄条形,长 8—12 毫米,略弯曲,稍成念珠状。种子每室 1 行, 3—5 枚,种子长 2—2.5 毫米。

产我国台湾北部。生于低湿处。也分布在日本。但未见标本,附志于此,留待核实。模式标本采自日本。

9. 山蓴菜(救荒本草)

Eutrema yunnanense Franch. Pl. Delav. 161. 1889; Diels in Bot. Jahrb. 29: 357. 1901; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 86(4, 105): 37. 1924; 秦岭植物志 1(2):