

米, 钝; 花瓣 5, 白色, 长圆状披针形, 长 3—4 毫米, 宽 1—1.2 毫米; 雄蕊 10, 长 3 毫米; 鳞片 5, 长方形, 长 0.8 毫米; 心皮 5, 椭圆状披针形, 长 3—4 毫米, 直立, 基部 1 毫米合生。种子少数。花期 7—10 月。

产西藏、云南、四川、湖北、陕西。生于海拔 1000—2500 米(四川、云南、湖北、陕西)或 2700—4300 米(西藏)的山坡林下石上。模式标本采自湖北宜昌。

全草药用, 煎水服, 治鼻出血。

8. **大叶火焰草** 荷莲豆景天(拉汉种子植物名称), 毛佛甲草(台湾植物志)

Sedum drymarioides Hance in Journ. Bot. 3: 379. 1865; Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 139. 1913; Hamet in Bull. Soc. Bot. France 71: 1216. 1924; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 40. p. maj. p., excl. syn. Franchetiana, pl. 24: 1. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 87. 图 1904. 1972; Liu, T. S. et N. J. Chung in Fl. Taiwan 3: 16. 1977; 湖北植物志 2: 62. 图 764. 1979.——*Sedum drymarioides* Hance var. *genuinum* Hamet in Bull. Soc. Bot. France 72: 51. sub nota, pl. III. 1, 2; pl. II. 4, 6, 9, 11. 1925. (sic!)——*Sedum uraiense* Hayata, Icon. Pl. Formos. 6: 20. f. 1916.

一年生草本。植株全体有腺毛。茎斜上, 分枝多, 细弱, 高 7—25 厘米。下部叶对生或 4 叶轮生, 上部叶互生, 卵形至宽卵形, 长 2—4 厘米, 宽 1.4—2.5 厘米, 先端急尖, 圆钝, 基部宽楔形并下延成柄, 叶柄长 1—2 厘米。花序疏圆锥状; 花少数, 两性; 花梗长 4—8 毫米; 萼片 5, 长圆形至披针形, 长 2 毫米, 先端近急尖; 花瓣 5, 白色, 长圆形, 长 3—4 毫米, 先端渐尖; 雄蕊 10, 长 2—3 毫米; 鳞片 5, 宽匙形, 先端有微缺至浅裂; 心皮 5, 长 2.5—5 毫米, 略叉开。种子长圆状卵形, 有纵纹。花期 4 月(福建以南)至 5—6 月(浙江等省), 果期 8 月。

产广西、广东、台湾、福建、湖北东部、湖南、江西、安徽、浙江、河南商城。生于海拔 940 米以下低山阴湿岩石上。模式标本采自广东肇庆七星岩。

9. **火焰草** 繁缕景天、卧儿菜(北京植物志), 繁缕叶景天(东北植物检索表) 图版 19: 13—18

Sedum stellariifolium Franch. in Nuov. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris II 7: 10. 1883 (Pl. David, 1: 130. 1884); 刘慎谔等, 东北植物检索表 126. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 87. 图 1903. 1972; 秦岭植物志 2 卷 2 册: 417. 1974; 湖北植物志 2: 62, 图 765. 1979.——*Sedum drymarioides* Hance var. *stellariaefolium* (Franch.) Hamet in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 151. 1913; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 1: 38. 1924; Hamet in Bull. Soc. Bot. France 71: 1221. 1924; 72: 51. pl. II: 1, 2, 3, 7, 10, 12. pl. III: 3. 1925; Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append.: 40. pl. 24: 2—3. f. 284—291. p. maj. p., excl. pl. Kiangsi. 1931; Laue-