

- 色,常具疏细齿;子房半下位,2室,具中轴胎座。种子具小瘤状突起……………8. 润边草属 *Peltoboykinia* (Engl.) Hara
7. 多年生,稀一年生或二年生草本。花通常辐射对称,稀两侧对称,组成聚伞花序或单生;花托杯状(内壁完全与子房下部愈合)或扁平。蒴果,稀蓇葖果……………9. 虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.
6. 萼片4—5(—7);花瓣5,或不存在;雄蕊4—10;子房通常1室,具2侧膜胎座,或上部1室,边缘胎座,而下部2室,中轴胎座。
9. 具托叶。萼片5;花瓣5,有时不存在;雄蕊5或10。
10. 单叶,或复叶具3小叶。花序总状或圆锥状,顶生或腋生;花瓣非羽状分裂;雄蕊10。2果瓣明显不等大……………10. 黄水枝属 *Tiarella* L.
10. 单叶。总状花序顶生;花瓣通常羽状分裂,稀全缘;雄蕊5或10。2果瓣近等大……………11. 唢呐草属 *Mitella* Tourn. ex L.
9. 无托叶。萼片4—5(—7);花瓣不存在,雄蕊4—10。
11. 无茎生叶。圆锥花序或总状花序;萼片(4—)5(—7);雄蕊8—10,子房近上位……………12. 峨屏草属 *Tanakaea* Franch. et Savat.
11. 茎生叶互生或对生。通常为聚伞花序;萼片4(—5);雄蕊4—8(—10);子房近上位、半下位至近下位……………13. 金腰属 *Chrysosplenium* Tourn. ex L.

族 1. 落新妇族——ASTILBEAE Miq.

Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 393. 1855; Melch. Engl. Syll. Pflanzenfam. ed. 12. 2: 202. 1964. — *Astilbinac* Engl. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(2a): 46. 1890 et in ibid. ed. 2. 18a: 112. 1928.

族的模式属: 落新妇属 *Astilbe* Buch.-Ham. ex D. Don

含3属,约24种,分布于东亚至北美。我国有3属,12种。

2. 大叶子属——*Astilboides* (Hemsl.) Engl.

Engl. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 18a: 116. 1928.

多年生草本。根状茎粗壮。基生叶很大,具长柄,盾状,掌状浅裂。圆锥花序顶生;花小,白色;萼片4—5;花瓣4—5,倒卵状长圆形;雄蕊(6—)8,花丝丝状;心皮2(—4),合生;子房半下位,2(—4)室,胚珠多数;花柱2—4。蒴果2—4室,种子具翅。染色体 $2n=34$,或 ≈ 36 。

属的模式种: 大叶子 *Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engl.

仅1种。

1. 大叶子(植物分类学报) 大脖子梗子(吉林),山荷叶(东北植物检索表) 图版2:

1—5

Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. in Engl. Pflanzenr. 69 (IV. 117): 675.