

缅甸北部也有。模式标本采自云南西南部。

3. 西南鬼灯檠(中国高等植物图鉴) 岩陀、毛青红、红姜、参麻(云南),野黄姜(贵州)

Rodgersia sambucifolia Hemsl. in Gard. Chron. Ser. 3. 39: 115. 1906; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 415. 1931; J. W. Besant in New Fl. Silva 5: 96. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 124. 图 1977. 1972; J. Cullen in Not. Bot. Gard. Edinb. 34(1): 117. f. 1e. 1975; 云南种子植物名录上册: 233. 1984. — *Spiraea holorrhodantha* Lévl. in Bull. Acad. Geog. Bot. 25: 44. 1915.

3a. 西南鬼灯檠(原变种) 图版 4:1—3

var. **sambucifolia**

多年生草本,高 0.8—1.2 米。茎无毛。羽状复叶;叶柄长 3.4—28 厘米,仅基部与小叶着生处具褐色长柔毛;小叶片 3—9 (—10),基生叶和下部茎生叶通常具顶生小叶片 3 枚,具侧生小叶片 6—7 枚(通常对生,稀互生),倒卵形、长圆形至披针形,长 5.6—20 厘米,宽 (1.7—)2.5—9 厘米,先端短渐尖,基部楔形,边缘有重锯齿,腹面被糙伏毛,背面沿脉生柔毛。聚伞花序圆锥状,长 13—38 厘米;花序分枝长 5.3—12 厘米;花序轴与花梗密被膜片状毛;花梗长 2—3 毫米;萼片 5,近卵形,长约 2 毫米,宽 1.5—1.8 毫米,腹面无毛,背面疏生黄褐色膜片状毛,先端短渐尖;花瓣不存在;雄蕊长约 3 毫米;心皮 2,长约 3 毫米,下部合生,子房半下位,花柱 2。染色体 $2n = 60$ 。 花果期 5—10 月。

产四川西南部、贵州(威宁)和云南北部。生于海拔 1800—3650 米的林下、灌丛、草甸或石隙。模式标本采自四川雅砻江流域。

根状茎入药;活血调经,祛风湿。

3b. 光腹鬼灯檠 图版 4:8—10

var. **estrigosa** J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 29(2):189.1991.

与原变种之区别是其小叶片腹面无糙伏毛。 花果期 5—8 月。

产四川(盐边)和云南(会泽、丽江)。生于海拔 2000—3700 米的林下或山坡石隙。模式标本采自四川(盐边)。

4. 羽叶鬼灯檠(中国药用植物志) 岩陀、九叶岩陀(云南种子植物名录),大红袍、蛇疔瘡(中国药用植物志)

Rodgersia pinnata Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris Ser. 2. 10: 176. 1888, in obs.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 415. 1931; J. W. Besant in New Fl. Silva 5: 95. 1933; 中国药用植物志 7. 图 340. 1964, in obs.; 中国高等植物图鉴 2: 124. 1972, p. p.; Cullen in Not. Bot. Gard. Edinb. 34(1): 118. f. 1a. 1975; 云南种子植物名录上册: 233. 1984. — *Astilbe pinnata* (Franch.) Franch. Pl. Delav. 231. 1890.

4a. 羽叶鬼灯檠(原变种) 图版 4:4—7