

Engl. in Engl. et Prantl, Nat. pflanzenfam. 3(2a): 52. 1980, non
Fontaine 1889.

多年生草本。根状茎粗壮,具鳞片。叶均基生,具长柄,阔卵形至近圆形,基部心形,不分裂或3—7(—9)裂,裂片边缘有锯齿。聚伞花序被柔毛,无苞片;托杯内壁仅基部与子房愈合;萼片5—6;花瓣5—6(—7),披针形,短于萼片;雄蕊5—6(—7),与花瓣互生,短于花瓣;心皮2,下部合生;子房半下位,下部1室,具2顶生状侧膜胎座,顶部1室,具边缘胎座。蒴果;种子多数。染色体: $2n = 34$ 。

属的模式种: 槭叶草 *Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.

有2种,分布于我国东北和朝鲜。我国产1种。

1. 槭叶草(植物分类学报) 爬山虎、腊八菜、丹顶草(辽宁) 图版7:1—3

Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 4:120.1935; Kitagawa, Lineam. Fl. Manch. 252. 1939; M. Noda, Fl. N.-E. Prov. (Manch.) China 603. 1971; 中国高等植物图鉴2: 137. 图2004. 1972; 东北草本植物志4: 212. 1980. —
Saxifraga rossii Oliv. in Hook. Icon. Pl. t. 1258. 1878. — *Aceriphyllum rossii* (Oliv.) Engl. in Engl. et Prantl, Nat. pflanzenfam. 3(2a):52. 1890 et in ibid. ed.2. 18a:117. 1928.


多年生草本,高20—36厘米。根状茎较粗壮,具暗褐色鳞片。叶均基生,具长柄;叶片阔卵形至近圆形,长10—14.3厘米,宽12—14.5厘米,掌状5—7(—9)浅裂至深裂,裂片近卵形,先端急尖,边缘有锯齿,两面均无毛;叶柄长7—15.5厘米,无毛。花萼被黄褐色腺毛。多歧聚伞花序长9—13.5厘米,具多花;花序分枝长达10厘米;花梗与托杯外面均被黄褐色腺毛;托杯内壁,仅基部与子房愈合;萼片狭卵状长圆形,长3—5毫米,宽约2毫米,无毛,单脉;花瓣白色,披针形,长约2.5毫米,宽约1毫米,单脉;雄蕊长约2毫米;心皮2,长约4毫米,下部合生;子房半下位。蒴果长约7.5毫米,果瓣先端外弯,果柄弯曲;种子多数。染色体 $2n = 34$ 。 花果期5—7月。

产吉林、辽宁。生于山谷石隙。朝鲜也有。合模式标本采自我国东北和朝鲜南部。供观赏。

7. 岩白菜属——*Bergenia* Moench

Moench, Meth. 664. 1794 (nom. cons.); Engl. in Engl. et Prantl,
Nat. pflanzenfam. 3(2a): 51.1890 et in ibid. ed. 2.18a:117. 1928;
Yeo in Kew Bull. 20(1):113.1966.

多年生草本。根状茎粗壮,肉质,具鳞片。单叶,均基生,厚而大,全缘或具齿,具小腺窝;叶柄基部具宽展的托叶鞘。聚伞花序圆锥状,具苞片;花较大,白色、红色或紫色;托杯



1—3. 槭叶草 *Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.: 1. 根状茎和叶, 2. 花, 3. 花剖开。4—8. 秦岭岩白菜 *Bergenia scopulosa* T.P. Wang: 4. 基生叶, 5. 花, 6. 萼片, 7. 花瓣, 8. 示雄蕊和雌蕊。
(潘锦堂、王颖绘)