

1. 秦岭岩白菜组——Sect. *Scopulosae* J. T. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **26**(2): 122. 1988.

组的模式种：秦岭岩白菜 *Bergenia scopulosa* T. P. Wang

本组较原始，仅 1 种，为我国特有。

1. 秦岭岩白菜(秦岭植物志) 盘龙七(秦岭) 图版 7:4—8

Bergenia scopulosa T. P. Wang in *Flora Tsinlingensis* **1**(2): 433. 1974; J. T. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **26**(2): 122. 1988.

多年生草本，高 10—50 厘米。根状茎粗壮，直径 2.5—4 厘米，密被褐色鳞片和残叶鞘，沿石隙匍生，半暴露。叶均基生；叶片革质，圆形、阔卵形至阔椭圆形，长(5—)16.5—25 厘米，宽(4—)13.2—22 厘米，先端钝圆，边缘波状或具波状齿，有时近全缘，基部通常圆形，稀宽楔形，两面具小腺窝，无毛；叶柄长 1.5—13 厘米，托叶鞘无毛。花葶无毛，中部以上具 1 披针形苞叶。聚伞花序；花梗长 5—9 毫米，无毛；托杯紫红色，外面无毛；萼片革质，卵形至阔卵形，长 4—4.5 毫米，宽 3.3—5 毫米，先端钝，两面无毛，具多脉；花瓣椭圆形、阔卵形至近圆形，长 8—9 毫米，宽 6—7.8 毫米，先端钝，基部渐狭成长约 1 毫米之爪，羽状达缘脉序；雄蕊长 4.5—5 毫米；子房卵球形，长约 4.5 毫米，花柱 2，长约 5 毫米，柱头大，盾状。 花果期 5—9 月。

产陕西(秦岭)和祁连山地区。生于海拔 2 500—3 600 米的林下阴湿处或峭壁石隙。模式标本采自陕西眉县(白杨台)。

根状茎入药；补脾健胃，除湿活血，清热败毒，收敛；主治急性肠炎、崩漏、白带、痢疾、黄水疮等。


2. 岩白菜组——Sect. *Bergenia*——*Bergenia* Group I. *Crassifoliae* Schneid. in *New Fl. Silva* **4**: 135. 1932.——*B.* Group III. *Purpurascens* Schneid. op. cit. 136. 1932.——Series *Crassifoliae* (Schneid.) A. Boriss. in *Not. Syst. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS* **16**: 97. 1954.——Series *Intermediae* A. Boriss. op. cit. 98. 1954.

组的模式种：厚叶岩白菜 *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch

本组有 2 种，我国均产。

2. 厚叶岩白菜(经济植物手册) 图版 8:1—8

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch in *Verh. Zool.-bot. Ges. Wien* **39**: 587. 1889; Schneid. in *New Fl. Silva* **4**: 135. 1932; A. Boriss. in *Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS* **16**: 98. 1954; 经济植物手册上册: 482. 1955; Yeo in *Kew Bull.* **20** (1): 118. 1966; J. T. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **26**(2): 123. 1988.——*Saxifraga crassifolia* L. *Sp. Pl.* 401. 1753.——*S. crassifolia* var. *β*. Ait. *Hort. Kew.* **2**: 79. 1789.——*Bergenia bifolia* Moench, *Meth. Pl.* 664. 1794.——*Saxifraga cordifolia*



1—3. 槭叶草 *Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.: 1. 根状茎和叶, 2. 花, 3. 花剖开。4—8. 秦岭岩白菜 *Bergenia scopulosa* T.P. Wang: 4. 基生叶, 5. 花, 6. 萼片, 7. 花瓣, 8. 示雄蕊和雌蕊。
(潘锦堂、王颖绘)