

凹,基部具长0.6—0.9毫米之爪,3—7脉,基部侧脉旁具2黄色斑点;雄蕊长2.5—4毫米,花丝棒状;子房近上位,卵球形,长1.6—3毫米,花柱2,长1—1.3毫米。成熟之蒴果长6—8毫米,2果瓣叉开。 花果期7—10月。

产甘肃南部、四川西部、云南西北部和西藏东南部。生于海拔3000—5000米的针叶林下、高山灌丛、高山草甸和高山碎石隙。印度北部、不丹、锡金、尼泊尔和克什米尔地区也有。模式标本采自喜马拉雅地区。

6. 微虎耳草(云南种子植物名录) 图版12:1—8

*Saxifraga parvula* Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. 5(24): 127. 1912 et in Bot. Jahrb. 48: 608. f. 17. 1912 et in Engl. Pflanzenr. 67 (IV. 117): 49. 1916; 云南种子植物名录上册: 243. 1984.

多年生小草本,高2.7—4厘米。叶全部基生,密集呈莲座状,革质,匙形,长14—17.5毫米,宽6.5—8毫米,先端稍钝,基部渐狭,边缘具7—9粗锯齿,并具睫毛,腹面中上部和背面均被卷曲柔毛。花葶纤细,被卷曲柔毛。单花,或聚伞花序具2花;花梗长5—13毫米,被卷曲柔毛;萼片在花期开展,稍肉质,卵形至三角状卵形,长2.5—2.8毫米,宽2.3—3毫米,先端稍钝,边缘疏生极少睫毛,3脉于先端汇合成1疣点;花瓣白色,基部具2斑点,卵形至椭圆形,长3—3.5毫米,宽2.4—2.6毫米,先端稍钝,基部具长约0.5毫米之爪,3脉;雄蕊长约2毫米,花丝棒状;子房近半下位,卵球形,长约3毫米,花柱2,长约0.3毫米,粗壮。蒴果长约7.5毫米,2果瓣大部离生。 花期7—8月。

产云南西北部。生于海拔3800—5700米的高山灌丛草甸或岩壁石隙。模式标本采自丽江。

组3. 石荷叶组——Sect. Irregulares Haw. Misc. Nat. 158. 1803; V. Sipl. in Taxon 31(1): 548. 1982.——*Diptera* Borkh. in Roem. Neues Mag. 1: 29. 1794.——*Saxifraga* Sect. *Diptera* (Borkh.) Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 2: 12. 1831; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 69 (IV. 117): 645. 1919.

组的模式种: 虎耳草 *Saxifraga stolonifera* Curt.

我国有2系,7种。

系1. 红毛系——Ser. Rufescentes J. T. Pan in Acta. Phytotax. Sin. 29 (1): 5. 1991.


系的模式种: 红毛虎耳草 *Saxifraga rufescens* Balf. f.

我国有6种。

7. 龙胜虎耳草(植物分类学报) 图版12:9—12

*Saxifraga longshengensis* J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 29 (1): 7. 1991.

多年生草本,高约32厘米。根状茎极短。叶均基生,具长柄;叶片椭圆形至长圆形,长



1—8. 微虎耳草 *Saxifraga parvula* Engl. et Irmsh.: 1. 全株, 2. 基生叶腹面, 3. 基生叶背面, 4. 花, 5. 萼片腹面, 6. 萼片背面, 7. 花瓣, 8. 示花梗、萼片、雄蕊和雌蕊。9—12. 龙胜虎耳草 *Saxifraga longshengensis* J. T. Pan: 9. 基生叶, 10. 萼片, 11. 花瓣, 12. 示花丝和雌蕊。13—16. 扇叶虎耳草 *Saxifraga rufescens* Balf. f. var. *flabellifolia* C. Y. Wu et J. T. Pan: 13. 基生叶, 14. 萼片; 15. 花瓣; 16. 示雄蕊和雌蕊。(潘锦堂, 刘进军绘)