

生,革质,卵形至阔卵形,长1.5—7.6厘米,宽1.2—5.9厘米,先端急尖,边缘有粗圆齿(圆齿边缘有不明显疏齿和腺毛),基部稍心形,腹面无毛,背面疏生粗毛并具褐色斑点,柄长1.1—12厘米,密被腺柔毛;茎生叶披针形,长约4.5毫米,宽约1毫米,边缘具腺毛。聚伞花序圆锥状,长约8.7厘米,具16—18花;花序分枝长2.4—5厘米,被腺柔毛,具2—3花;花梗纤细,长1.3—3厘米,被腺柔毛;花两侧对称;萼片在花期开展至反曲,狭卵形,长约3毫米,宽约1毫米,腹面无毛,背面和边缘具腺毛,3脉于先端汇合成1疣点;花瓣白色,5枚,其中3枚较小,三角状卵形,长3.2—3.4毫米,宽2—2.2毫米,先端急尖至短渐尖,基部圆形至心形,并具长约1毫米之爪,3脉,1枚较长,狭卵形,长约9毫米,宽约2.2毫米,先端渐尖,基部具长约1.4毫米之爪,3脉,另一枚最长,近披针形,长约18.5毫米,宽约3.4毫米,先端渐尖,基部渐狭成长约1.5毫米之爪,边缘疏生细齿,8脉;雄蕊长约6毫米,花丝棒状;2心皮中下部合生;子房近上位,卵球形,长约4毫米,花柱2,长约1.8毫米,叉开。 花果期5—10月。

产云南(砚山、蒙自)。生于海拔1100—1850米的林下或山坡。模式标本采自蒙自。

12. 卵心叶虎耳草(中国高等植物图鉴) 图版14:9—12

Saxifraga aculeata Balf. f. in Trans. Bot. Soc. 27:70. 1916. — *S. geifolia* Balf. f. op. cit. 72; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2):427. 1931. — *S. mengtzeana* var. *cordatifolia* Engl. et Irmsch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 6:37. 1913 et in Engl. Pflanzenz. 69(IV. 117):647. f. 124D. 1919; 云南种子植物名录上册: 241. 1984. — *S. ovatocordata* Hand. -Mazz. op. cit. 425; 中国高等植物图鉴补编 2: 36. 1983; 云南种子植物名录上册: 242. 1984.

多年生草本,高20—36厘米。根状茎较短。茎不分枝,被褐色腺毛。基生叶具长柄,叶片革质,通常卵形,稀阔卵形至肾形,长1.2—10厘米,宽1—8.4厘米,先端急尖或钝,边缘具波状粗齿和腺毛,基部心形(与叶柄连结处具芽),两面被糙腺毛和斑点,叶柄长1.5—12厘米,被褐色腺毛;茎生叶1—4枚,披针形至卵形,长2.5—5毫米,宽约1.1毫米,腹面无毛,背面和边缘具腺毛,单脉。聚伞花序圆锥状,长13—22厘米,具12—30花;花序分枝长3—9.5厘米,被腺毛,具2—4花;花梗长0.6—2厘米,纤细,疏生短腺毛;花两侧对称;萼片在花期开展至反曲,卵形,长1.6—4毫米,宽1—1.6毫米,先端钝或急尖,腹面通常无毛,背面和边缘具腺毛,(2—)3脉于先端汇合成1疣点;花瓣白色,5枚,其3枚较短,卵形,长2—4.5毫米,宽1.3—2.2毫米,先端急尖至短渐尖,基部具长0.2—1毫米之爪,(1—)3—5脉,1枚较长,披针形至线状披针形,长3.3—17.5毫米,宽1.2—2毫米,基部具长0.3—1毫米之爪,3—5(—12)脉,另1枚最长,线状披针形至披针形,长12.6—29.3毫米,宽2.2—7.5毫米,先端急尖至稍渐尖,基部渐狭成长0.2—2毫米之爪,5—9(—15)脉;雄蕊长4.5—5.5毫米,花丝棒状;2心皮中下部合生,长4.5—5.1毫米;子房近上位,卵球形,长2—3.3毫米,花柱2,长1.8—3.2毫米。蒴果长3—4.6毫米,2果瓣叉

开。花果期 5—10 月。

产广东东北部、广西东北部、四川西部、云南东南部至西北部。生于海拔 800—3 800 米的林下和岩壁石隙。模式标本采自云南蒙自。

全草入药；微苦、辛，寒，有小毒；清热解毒，凉血止血。

系 2. 石荷叶系——Ser. Stonoliferae J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 29(1):

8. 1991.


系的模式种：虎耳草 *Saxifraga stolonifera* Curt.

我国有 1 种。

13. 虎耳草(履巉岩本草) 石荷叶(本草纲目)，金线吊芙蓉、老虎耳(生草药性备要)，天荷叶、金丝荷叶(现代实用中药)，丝棉吊梅(中国药用植物志)，耳朵草(闽东本草)，通耳草(陕西汉中、武都)，天青地红(云南文山) 图版 15:7—10

Saxifraga stolonifera Curt. in Philos. Trans. London B. 64. 1. 308, No. 2541. 1774; Ohwi, Fl. Jap. 503. 1965. — *S. stolonifera* Meerb. Afbeeld. t. 23. 1775, non Curt. 1774; Hand. -Mazz. Symb. Sin 7(2):427. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 137. 图 2003. 1972; 秦岭植物志 1(2): 434. 1974; 湖北植物志 2: 80. 图 793. 1979; 云南种子植物名录上册: 245. 1984; 北京植物志上册: 345. 图 422. 1984 (修订版). — *S. sarmentosa* L. in Eliss, de Dionaea, Cur. Schreb. ed. 2, 16. 1780; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 69(IV. 117): 652. 1919. — *S. ligulata* Murr. in Comm. Goetting. 26. t. 1. 1781. — *S. chinensis* Lour. Fl. Cochinch. 281. 1790. — *S. sarmentosa* L. var. *immaculata* Diels in Bot. Jahrb. 29:364. 1901. — *S. chaffanjonii* Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 9:452. 1911, "chaffanjonii". — *S. dumetorum* Balf. f. in Trans. Bot. Soc. 27:71. 1918. — *S. veitchiana* Balf. f. op. cit. 75. — *S. iochanensis* Lévl. Sert. Yunnan. 2. 1916; 云南种子植物名录上册: 239. 1984. — *S. stolonifera* Meerb. var. *immaculata* (Diels) Hand.-Mazz. 1. c.

多年生草本，高 8—45 厘米。匍匐枝细长，密被卷曲长腺毛，具鳞片状叶。茎被长腺毛，具 1—4 枚苞片状叶。基生叶具长柄，叶片近心形、肾形至扁圆形，长 1.5—7.5 厘米，宽 2—12 厘米，先端钝或急尖，基部近截形、圆形至心形，(5—)7—11 浅裂(有时不明显)，裂片边缘具不规则齿牙和腺毛，腹面绿色，被腺毛，背面通常红紫色，被腺毛，有斑点，具掌状达缘脉序，叶柄长 1.5—21 厘米，被长腺毛；茎生叶披针形，长约 6 毫米，宽约 2 毫米。聚伞花序圆锥状，长 7.3—26 厘米，具 7—61 花；花序分枝长 2.5—8 厘米，被腺毛，具 2—5 花；花梗长 0.5—1.6 厘米，细弱，被腺毛；花两侧对称；萼片在花期开展至反曲，卵形，长 1.5—3.5 毫米，宽 1—1.8 毫米，先端急尖，边缘具腺毛，腹面无毛，背面被褐色腺毛，3 脉于先端汇合成 1 疣点；花瓣白色，中上部具紫红色斑点，基部具黄色斑点，5 枚，其中 3 枚



1—4. 齿瓣虎耳草 *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *fortunei*: 1. 基生叶, 2. 萼片背面, 3. 花瓣, 4. 蒴果。5—8. 镜叶虎耳草 *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *koraiensis* Nakai.: 5. 基生叶, 6. 花, 7. 萼片, 8. 花瓣。9—12. 卵心叶虎耳草 *Saxifraga aculeata* Balf. f.: 9. 基生叶, 10. 萼片腹面, 11. 萼片背面, 12. 花瓣。(潘锦堂, 刘进军绘)