

产我国西藏(波密、墨脱)。生于海拔 4 100—4 300 米的高山灌丛草甸和高山碎石隙。模式标本采自西藏(墨脱)。

81. 心虎耳草(西藏植物志)

Saxifraga cordigera Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2:68. 1857; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:391. 1878; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117):125. 1916; Hara, Fl. E. Himal. 166. 1966; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2:151. 1979; 西藏植物志 2: 477. 1985.

多年生草本,丛生,高 4—6 厘米,小主轴细弱。茎被褐色长腺柔毛。基生叶具长柄,叶片卵形或倒卵形,长约 3 毫米,宽约 2.5 毫米,腹面和边缘具褐色长柔毛,叶柄基部扩大呈鞘状,具长睫毛;茎生叶无柄,彼此靠接,下部者卵形,上部者阔卵形,长 4—6 毫米,宽 4—5 毫米,先端钝,基部心形,边缘具长睫毛。花单生于茎顶;萼片在花期直立,近椭圆形至卵形,长约 5.5 毫米,先端钝,边缘具睫毛,3—7 脉于先端汇合成 1 疣点;花瓣橙黄色,倒卵形,长约 11 毫米,先端钝圆,基部变狭成爪,5—7 脉,无疣体;雄蕊长约 5.7 毫米,花丝钻形;子房卵球形,花柱 2,起初直立,后变叉开。花果期 7—9 月。

产我国西藏南部。生于高山。锡金、尼泊尔也有。模式标本采自锡金、尼泊尔一带。

82. 长毛梗虎耳草(西藏植物志) 图版 34:9—13

Saxifraga eglandulosa Engl. in Bot. Jahrb. 48:576. f. 4E—G. 1912; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117):104. f. 19E—G. 1916; 西藏植物志 2: 470. 图 156: 1—7. 1985. —*S. kingdonii* Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. 48:179. 1929. —*S. rockii* Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. 18(90):267. 1935.

多年生草本,丛生,高 8.5—15 厘米。茎被褐色卷曲长柔毛。基生叶不发达,较小且早枯,叶片狭卵形,长约 1 厘米,宽约 6 毫米,具长约 1.4 厘米之柄;茎生叶约 6 枚,最下部者具长柄,叶片卵形,长约 1.8 厘米,宽约 1 厘米,先端急尖,两面和边缘多少具褐色长腺毛,叶柄长约 1.2 厘米,具卷曲长腺毛,中部者无柄,卵形,长约 1.6 厘米,宽约 1 厘米,先端急尖,基部圆形,最上部者卵状心形,长约 1.3 厘米,宽约 7.5 毫米,先端渐尖,基部心形且抱茎。单花生于茎顶,或聚伞花序具 2—3 花;花梗长 1.3—2.3 厘米,被褐色卷曲长腺毛;萼片在花期开展,近圆形至椭圆形,长 4.2—6 毫米,宽 3.3—3.8 毫米,两面无毛或疏生腺柔毛,边缘具褐色卷曲长腺毛,6—7 腺于先端汇合成 1 疣点;花瓣黄色,阔椭圆形至圆形,长 6.2—8 毫米,宽 6—7 毫米,先端微凹,基部具长约 0.7 毫米之爪或无爪,6—7 脉,无疣体;雄蕊长约 6 毫米,花丝钻形;子房上位,近圆球形,径长约 4 毫米,花柱 2,长约 2 毫米。花期 7—8 月。

产云南西北部和西藏南部。生于海拔 3 600—4 500 米的高山草甸和高山碎石隙。模式标本采自西藏南部。

83. 聂拉木虎耳草(植物分类学报) 图版 34:16—21