

月。

产我国西藏(聂拉木)。生于海拔 3 800—3 900 米的灌丛中。尼泊尔也有。模式标本采自尼泊尔。

88. 梅花草叶虎耳草(西藏植物志)

Saxifraga parnassifolia D. Don in Trans. Linn. Soc. **13**: 405. 1821; Prodr. Fl. Nepal. 210. 1825; Wall. Cat. no. 451. 1829; Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. **2**: 27. t. 25. 1831; H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. **2**(9): 232. f. 2d—g. 1960; Hara in Ohashi, Fl. E. Himal. **3**:50. 1975; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal **2**:154. 1979; 西藏植物志 **2**: 478. 1985. — *S. diversifolia* Wall. ex Ser. *β. parnassifolia* Ser. in DC. Prodr. **4**:44. 1830; Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**(24): 138. 1912 et in Engl. Pflanzenr. **67**(IV. 117): 129. 1916.

88a. 梅花草叶虎耳草(原变种) 图版 35:13—19

var. *parnassifolia*

多年生草本,丛生,高 11.5—24 厘米。茎不分枝,密被褐色卷曲长腺毛。基生叶具长柄,叶片心状卵形,长 1.5—4 厘米,宽 1.3—3 厘米,先端急尖,基部心形,两面和边缘均具卷曲长柔毛(有的具腺头),叶柄长 1.25—2.7 厘米,具卷曲腺柔毛;茎生叶 6—7 枚,向上渐变小,卵形至心形,长 9—3.5 厘米,宽 0.45—2.3 厘米,先端钝或急尖,基部心形,无柄且半抱茎,下部者两面和边缘均具卷曲长腺毛,最上部者两面被褐色短腺毛,边缘具长、短两种腺毛。多歧聚伞花序长 2—2.5 厘米,具 6—11 花;花梗被短腺毛;萼片在花期直立至开展,卵形至阔卵形,长 3—4 毫米,宽 1.5—2.9 毫米,腹面上部、背面和边缘均具褐色短腺毛,5—7 脉于先端汇合成 1 疣点;花瓣黄色,倒卵形至阔卵形,长 5—7.9 毫米,宽 3.5—4 毫米,先端钝,基部狭缩成长 0.6—1.7 毫米之爪,5—7 脉,具隆起之近柱状 4—6 疣体;雄蕊长 2.5—4 毫米,花丝钻形;子房近上位,卵球形,长 1.6—2.5 毫米,花柱 2,长 1—2 毫米。花期 7—9 月。

产我国西藏(聂拉木)。生于海拔 2 700—2 800 米的山坡。印度、不丹、锡金、尼泊尔均有。模式标本采自尼泊尔。

88b. 隐疣虎耳草(变种)(西藏植物志) 图版 35:20—26

var. *obscuricallosa* J. T. Pan in C. Y. Wu, Fl. Xizang. **2**: 478. 1985.

此变种与原变种之区别在于其下部茎生叶和基生叶腹面无毛;花瓣无疣体或具极不明显之 2—3 小疣体(而非隆起之柱状疣体)。花期 7—9 月。

产我国西藏(察隅)。生于海拔 4 000 米左右的冷杉林缘。

89. 小泡虎耳草(中国高等植物图鉴) 图版 35:27—33

Saxifraga bulleyana Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**(24): 130. t. 91. 1912 et in Engl. Pflanzenr. **67**(IV. 117): 92. f. 20A—D. 1916; 中国高等植