

期反曲，卵形，长约 2 毫米，宽约 1.2 毫米，先端稍钝，无毛，3 脉于先端不汇合；花瓣黄色，长圆形，长约 1.6 毫米，宽 2.1—2.2 毫米，先端急尖，基部狭缩成长约 0.9 毫米之爪，3 脉，基部侧脉旁具 2 痴体；雄蕊长约 3.9 毫米，花丝钻形；子房近上位，卵球形，长约 2 毫米，花柱 2，长约 1.8 毫米。花果期 7—9 月。

产我国西藏(贡觉、林芝)。生于海拔 3 500—3 900 米的栎林下或石隙。模式标本采自林芝。

111. 聚叶虎耳草(中国高等植物图鉴) 图版 41:20—26

Saxifraga confertifolia Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. 50(Beibl. 144): 43. 1914 et in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 94. 1916; 中国高等植物图鉴 2: 127. 图 1983. 1972, p. p.; 秦岭植物志 1(2): 438. 1974.


多年生草本，高 4—10.5 厘米，丛生。茎紫红色，密被腺毛，基部具较小之莲座叶丛。莲座叶丛之叶片肉质，椭圆形至匙状长圆形，长 3—5 毫米，宽 1—1.6 毫米，先端具软骨质短尖头，两面无毛或背面疏生刚毛，边缘具软骨质刚毛状睫毛；茎生叶肉质，较密，以中部者较大，向上、向下渐变小，长圆形、披针形至线形，长 5—7.5 毫米，宽 1—2 毫米，先端急尖且具短尖头，下部者，两面和边缘均具腺毛，中部以上者，腹面无毛，背面和边缘具腺毛。多歧聚伞花序长 1.2—3.5 厘米，具 2—12 花，或单花生于茎顶；花梗长 6—7 毫米，被褐色腺毛；萼片在花期开展至反曲，卵形，长 1.4—2.3 毫米，宽 1—1.1 毫米，腹面凹陷，先端急尖或钝，无毛，3 脉于先端不汇合；花瓣黄色，下部具橙色斑点，近长圆形至狭卵形，长 3.3—5.9 毫米，宽 1.5—2.5 毫米，先端急尖或钝，基部狭缩成长 0.3—0.6 毫米之爪，3 脉，基部侧脉旁具 2 痴体；雄蕊长 1.5—4 毫米，花丝钻形；子房近上位，卵球形至倒卵球形，长 1.5—2 毫米，花柱 2，长 0.3—1.5 毫米。花果期 7—9 月。

产陕西(眉县、华县)和四川西部。生于海拔 3 000—4 000 米的高山草甸和石隙。模式标本采自四川西部。

112. 异毛虎耳草(植物分类学报) 图版 41:27—32

Saxifraga heterotricha Marquand et Airy-Shaw in Journ. Linn. Soc. Bot. 48. 177. 1929; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 15. 1978; 中国高等植物图鉴补编 2: 33. 1983; 西藏植物志 2: 498. 图 164: 13—18. 1985.

草本，高 9.5—12 厘米。茎不分枝，中上部疏生黑褐色腺毛。基生叶密集，呈莲座状，短匙形，长 4.8—5.2 毫米，宽 1.5—2.1 毫米，先端急尖，两面无毛，边缘具刚毛状睫毛；茎生叶较疏，卵形、倒卵形至椭圆形，长 4.8—7 毫米，宽 2.9—3.2 毫米，先端急尖，两面无毛，边缘具黑褐色腺睫毛。聚伞花序长 3.5—4.5 厘米，具 3—5 花；花梗长 1.8—2.2 厘米，纤细，上部无毛，中下部疏生黑褐色腺毛；萼片在花期反曲，近卵形，长约 1.6 毫米，宽约 0.8 毫米，先端急尖，无毛，3 脉于先端不汇合；花瓣黄色，长圆形，长约 4.8 毫米，宽约 1.4 毫米，先端稍钝，基部无爪，3 脉，具 4 痴体；雄蕊长约 3.2 毫米，花丝钻形；子房近上位，狭卵球



1—6. 肉质虎耳草 *Saxifraga carnosula* Mattf.: 1. 全株, 2. 基生叶, 3. 茎生叶, 4. 萼片, 5. 花瓣, 6. 示花梗、萼片、花丝和雌蕊。7—12. 橙黄虎耳草 *Saxifraga aurantiaca* Franch.: 7. 全株, 8. 基生叶, 9. 茎生叶, 10. 萼片, 11. 花瓣, 12. 示花梗、雄蕊和雌蕊。13—19. 线叶虎耳草 *Saxifraga taraktophylla* Marquand et Airy-Shaw: 13. 全株, 14. 茎下部叶, 15. 茎中部叶, 16. 茎上部叶, 17. 萼片, 18. 花瓣, 19. 示花梗、萼片、雄蕊和雌蕊。20—26. 聚叶虎耳草 *Saxifraga confertifolia* Engl. et Irmsch.: 20. 全株, 21. 莲座叶, 22. 茎下部叶, 23. 茎中部叶, 24. 萼片, 25. 花瓣, 26. 示花梗、雄蕊和雌蕊。27—32. 异毛虎耳草 *Saxifraga heterotricha* Marquand et Airy-Shaw: 27. 全株, 28. 基生叶, 29. 茎生叶, 30. 萼片, 31. 花瓣, 32. 示花梗、萼片、雄蕊和雌蕊。(潘锦堂、刘进军绘)