

毛,背面被腺毛,3—5脉于先端半汇合至汇合;花瓣黄色,中下部具橙色斑点,椭圆形至卵形,长4.1—5毫米,宽2—2.2毫米,先端钝或急尖,基部具长0.5—0.6毫米之爪,5脉,基部侧脉旁具2疣体或无疣体;雄蕊长约3.5毫米,花丝钻形;子房近上位,阔卵球形,长约3毫米,花柱长约1毫米。花期7—8月。

产青海(黄南、玉树、海西等州)、云南(贡山)和西藏。生于海拔3000—5800米的高山草甸、高山灌丛草甸和高山碎石隙。尼泊尔也有。模式标本采自青海(可可西里山)。

130b. **秃萼虎耳草**(变种)(西藏植物志) 图版46:1—4

var. **glabrisepala** J. T. Pan in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 2:503. 1985.

此变种之小茎轴有时多分枝,交错叠结成座垫状,叶片近卵形(非近匙形),无毛或仅边缘下部具极少刚毛状睫毛(非腺睫毛),花梗近无毛,萼片无毛,可与原变种区别。花期7—8月。

产我国西藏(八宿、墨脱、巴青、加查、定结)。生于海拔4200—4900米之高山草甸和高山碎石隙。模式标本采自定结。

131. **爪瓣虎耳草**(植物分类学报)

Saxifraga unguiculata Engl. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. 29:115. 1883; Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. 48:601. f. 13J—M. 1912 et in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 149. f. 35J—M. 1916; 中国高等植物图鉴 2: 133. 图1995. 1972; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2):20. f. 5. 1978; 西藏植物志 2: 500. 1985, p. p.—*S. unguiculata* β . *auctiflora* Engl. op. cit. 116. 1883; Engl. et Irmsch. l. c.—*S. unguiculata* γ . *subglabra* Engl. l. c.—*S. unguiculata* subvar. *aurea* Engl. l. c.—*S. aurantiaca* Franch. f. *lanceolata* Ku in Bull. Bot. Res. 9(4): 18. 1989.

131a. **爪瓣虎耳草**(原变种) 图版46:5—11

var. **unguiculata**

多年生草本,高2.5—13.5厘米,丛生。小主轴分枝,具莲座叶丛;花茎具叶,中下部无毛,上部被褐色柔毛。莲座叶匙形至近狭倒卵形,长0.46—1.9厘米,宽1.5—6.8毫米,先端具短尖头,通常两面无毛,边缘多少具刚毛状睫毛;茎生叶较疏,稍肉质,长圆形、披针形至剑形,长4.4—8.8毫米,宽1—2.3毫米,先端具短尖头,通常两面无毛,边缘具腺睫毛(有时腺头掉落),稀无毛或背面疏被腺毛。花单生于茎顶,或聚伞花序具2—8花,长2—6厘米,细弱;花梗长0.3—2.5厘米,被褐色腺毛;萼片起初直立,后变开展至反曲,肉质,通常卵形,长1.5—3毫米,宽1—2.1毫米,先端钝或急尖,腹面和边缘无毛,背面被褐色腺毛,3—5脉于先端不汇合、半汇合至汇合;花瓣黄色,中下部具橙色斑点,狭卵形、近椭圆形、长圆形至披针形,长4.6—7.5毫米,宽1.8—2.9毫米,先端急尖或稍钝,基部具长0.1—1毫米之爪,3—7脉,具不明显之2疣体或无疣体;雄蕊长2.8—4.3毫米;子房近上位,阔卵球形,长2.3—3.8毫米,花柱长0.5—1.4毫米。花期7—8月。