

产甘肃南部、青海(海东、海北、黄南、玉树)、四川西部、云南西北部和西藏。生于海拔 3 200—5 644 米的林下、高山草甸和高山碎石隙。模式标本采自青海(夏哈日山)。

全草入药;苦,寒;清肝胆之热,排脓敛疮。

131b. 五台虎耳草 图版 46:12—17

var. *limprichtii* (Engl. et Irmsch.) J. T. Pan, stat.nov. — *S. limprichtii* Engl. et Irmsch. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 6:36. 1913 et in Engl. Pflanzenr. 67 (IV. 117): 150. 1916; H. Smith in Acta Hort. Gothob. 1:16. 1924.

此变种与原变种之区别是其萼片边缘通常多少具腺睫毛。花期 7—8 月。

产河北(小五台山)、山西(五台山)和宁夏(贺兰山、泾源)。生于海拔 1 800—3 250 米的山坡石隙。

132. 藏中虎耳草(植物分类学报)松吉斗 (藏名) 图版 46:18—24

Saxifraga signatella Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. 48:182. 1929; 西藏植物志 2: 500. 图 165: 1—7. 1985. — *S. brunneopunctata* H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(9):257. 1960.


草本,高 2.5—7.5 厘米。茎不分枝,密被黑褐色腺毛。基生叶密集,呈莲座状,稍肉质,通常匙形,长 6—9.2 毫米,宽 1.6—2.8 毫米,先端具短尖头,两面无毛,边缘上部通常具软骨质刚毛状睫毛;茎生叶较疏,长圆形至披针形,长 3.5—5.5 毫米,宽 0.8—1.7 毫米,先端急尖,两面和边缘均具黑褐色短腺毛,稍肉质。聚伞花序长 2.4—4.5 厘米,具 2—12 花,稀单花生于茎顶;花梗纤细,长 1—2.5 厘米,密被黑褐色腺毛;萼片在花期开展,卵形至阔卵形,长 2—2.6 毫米,宽 1—2.4 毫米,先端急尖或钝,腹面无毛,背面和边缘下部具黑褐色腺毛,或边缘无毛,3—5 脉于先端不汇合至汇合;花瓣黄色,中下部具黑紫色斑点,长圆形至披针形,长 4—7 毫米,宽 1.6—2.2 毫米,先端急尖,基部渐狭成长 0.5—0.9 毫米之爪,3—5 脉,侧脉旁具 2 疵体;雄蕊长 3—3.3 毫米,花丝钻形;子房近上位,黑紫色,阔卵球形,长 1.6—2.8 毫米,花柱长约 1 毫米。花果期 7—9 月。

产我国西藏(墨脱、拉萨、南木林)。生于海拔 3 900—5 400 米的高山草甸、高山沼泽化草甸和高山碎石隙。模式标本采自西藏墨脱(那木拉)。

全草入药;性味功用同爪瓣虎耳草。

133. 金星虎耳草(植物分类学报) 图版 46:25—30

Saxifraga stella-aurea Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2:72. 1857; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 155. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7(2): 424. 1931; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 15. 1978; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2:155. 1979; 中国高等植物图鉴补编 2: 33. 1983; 云南种子植物名录上册: 245. 1984; 西藏植物志 2: 501. 图 165:22—27. 1985. — *S. jacquemontiana* Dcne. var. *stella-aurea* (Hook. f. et Thoms.) Clarke in Hook.



1—4. 亮萼虎耳草 *Saxifraga nanella* Engl. et Irmisch. var. *glabrisepala* J. T. Pan: 1. 叶片, 2. 萼片, 3. 花瓣, 4. 示花梗、雄蕊和雌蕊。5—11. 爪瓣虎耳草 *Saxifraga unguiculata* Engl. var. *unguiculata*: 5. 全株, 6. 莲座叶, 7. 茎中部叶, 8. 茎上部叶, 9. 萼片背面, 10. 花瓣, 11. 示花梗、雄蕊和雌蕊。12—17. 五台虎耳草 *Saxifraga unguiculata* Engl. var. *limprichtii* (Engl. et Irmisch.) J. T. Pan: 12. 莲座叶, 13. 茎生叶, 14. 萼片腹面, 15. 萼片背面, 16. 花瓣, 17. 示花梗、雄蕊和雌蕊。18—24. 藏中虎耳草 *Saxifraga signatella* Marquand: 18. 全株, 19. 基生叶, 20. 茎生叶, 21. 萼片腹面, 22. 萼片背面, 23. 花瓣, 24. 示花梗、雄蕊和雌蕊。25—30. 金星虎耳草 *Saxifraga stella-aurea* Hook. f. et Thoms.: 25. 全株, 26. 莲座叶, 27. 萼片腹面, 28. 萼片背面, 29. 花瓣, 30. 示花梗、雄蕊和雌蕊。31—39. 葶苈虎耳草 *Saxifraga drabiformis* Franch.: 31. 全株, 32. 不育枝之叶, 33. 花茎下部叶, 34. 花茎中部叶, 35. 花茎上部叶, 36. 萼片腹面, 37. 萼片背面, 38. 花瓣, 39. 示花梗、雄蕊和雌蕊。(潘锦堂、刘进军绘)