

Delav. 236. t. 506. 1890, non Gray 1877.

多年生草本,高约 1.5 厘米。小主轴分枝,具莲座叶丛;花茎具褐色柔毛。莲座叶近倒披针形,长约 6 毫米,宽约 1.5 毫米,先端具短尖头,两面无毛,边缘上部具软骨质刚毛状睫毛,3 脉,肉质;茎生叶近倒披针形,长 4—4.2 毫米,宽 1—1.3 毫米,先端具短尖头,两面无毛,边缘上部具软骨质刚毛状睫毛,3 脉,肉质。花单生于茎顶;花梗短,被褐色柔毛,萼片在花期开展至反曲,稍肉质,卵形,长 2.9—3 毫米,宽约 1.5 毫米,两面无毛,边缘近先端处具刚毛状睫毛,5 脉于先端汇合;花瓣黄色,椭圆形,长约 5 毫米,宽约 2.8 毫米,先端钝圆,基部突然变狭成长约 0.8 毫米之爪,5 脉,无疵体;雄蕊长 2—3 毫米,花丝钻形;子房近上位,阔卵球形,长约 1.8 毫米,花柱长约 0.9 毫米。花期 7—8 月。

产云南(中甸、丽江)。生于海拔 2 700—5 300 米的石隙。模式标本采自云南丽江。

137. 囊谦虎耳草(植物分类学报) 图版 47:16—20

Saxifraga nangqenica J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 28(5): 392. 1990. —
S. prattii Engl. et Irmsch. var. *obtusata* auct. non Engl.: J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 15. 1978.

多年生草本,高 3.5—5 厘米。小主轴分枝;花茎被褐色卷曲长腺毛。茎生叶以中部者较大,向下向上则变小,长圆形至近狭倒卵形,长 5—7.8 毫米,宽 1.8—2.5 毫米,先端钝,下部者无毛,中上部者两面无毛,边缘具褐色柔毛。花单生于茎顶;花梗长 1.4—1.6 厘米,被褐色卷曲长腺毛;萼片在花期直立,近阔卵形,长约 4 毫米,宽约 3 毫米,先端钝状急尖,腹面和边缘无毛,背面疏生褐色柔毛,3 脉于先端汇合;花瓣黄色,卵形,长约 6.5 毫米,宽约 4 毫米,先端钝,基部无爪,7 脉,无疵体;雄蕊长约 5 毫米,花丝钻形;子房近上位,阔卵球形,长约 3.4 毫米,花柱长约 2 毫米。花期 7—8 月。

产青海(囊谦)。生于海拔 5 200 米的高山碎石隙。模式标本采自青海囊谦。

138. 小斑虎耳草(中国高等植物图鉴补编)

Saxifraga punctulata Engl. in Bot. Jarhb. 48:601. f.13 N—Q. 1912; Engl. et Irmsch. in Engl. pflanzenr. 67(IV. 117): 148. f. 35N—Q. 1916; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 154. 1979;中国高等植物图鉴补编 2: 32. 1983;西藏植物志 2: 492. 图 162: 16—22. 1985.

138a. 小斑虎耳草(原变种) 图版 47:21—27

var. *punctulata*

多年生草本,高 2.8—6 厘米,丛生。茎被黑紫色腺毛。基生叶密集,呈莲座状,肉质肥厚,匙形,长 3.5—4 毫米,宽约 1.4 毫米,先端钝,两面无毛,腹面上部具瘤状突起,边缘具软骨质突起和睫毛(有的具腺头);茎生叶亦密集,肉质,近匙形,长约 4.9 毫米,宽约 1.4 毫米,先端钝,两面和边缘均具黑紫色腺毛,腹面最上部具瘤状突起。花单生于茎顶,或聚伞花序具 2—3 花;花梗长 1.3—3 厘米,被黑紫色腺毛;萼片在花期直立,稍肉质,卵形,