

我国有 6 种。

161. 对叶虎耳草(西藏植物志) 图版 53:22—26

*Saxifraga contraria* H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(9): 252. f. 14a—d. 1960; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 151. 1979; 西藏植物志 2: 491. 1985.

多年生草本,高约 1 厘米,丛生。小主轴极多分枝;花茎下部无毛,上部被白色柔毛。叶对生,密集,呈莲座状,肉质肥厚,椭圆形,长约 2 毫米,宽约 1.1 毫米,先端钝圆,两面无毛,边缘具刚毛状睫毛。花单生于茎顶;花梗长约 1 毫米,被白色柔毛;苞片 2,对生,肉质肥厚,椭圆形,长约 2 毫米,宽约 1 毫米,先端钝圆,边缘具刚毛状睫毛;托杯基部囊状;萼片在花期开展,肉质,近卵形,长 1.5—1.8 毫米,宽 1—1.5 毫米,先端钝,无毛,3 脉于先端不汇合;花瓣黄色,卵形至椭圆形,长约 2 毫米,宽约 1.1—1.3 毫米,先端微凹,基部狭缩成长约 0.5 毫米之爪,3 脉,基部侧脉旁具 2 痂体;雄蕊长约 2 毫米,花丝钻形;子房近半下位,阔卵球形,长约 1.4 毫米,周围具环状花盘,花柱长约 0.5 毫米。花期 7—8 月。

产我国西藏(米林、拉萨)。生于海拔 4 350—4 800 米的高山碎石隙。

162. 唐古特虎耳草(青藏高原药物图鉴) 甘青虎耳草(中国高等植物图鉴),桑斗(藏名)

*Saxifraga tangutica* Engl. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 29: 114. 1883; Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. 48: 580. f. 5 A—D. 1912 et in Engl. Pflanzenr. 67(IV. 117): 107. f. 21 A—D. 1916; 中国高等植物图鉴 2: 128. 图 1986. 1972; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 17. 1978; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 155. 1979; 西藏植物志 2: 482. 1985. —*S. hirculus* var. *subdioica* Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 392. 1878; Engl. et Irmsch. op. cit. 113. 1916. —*S. tangutica* Engl. var. *minutiflora* Engl. l.c.; Engl. et Irmsch. op. cit. 109. 1916; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 13. 1978. —*S. flagrans* H. Smith in Acta Hort. Gothob. 1: 4. f. 1a—e. 1924.

162a. 唐古特虎耳草(原变种) 图版 54:1—6

var. *tangutica*

多年生草本,高 3.5—31 厘米,丛生。茎被褐色卷曲长柔毛。基生叶具柄,叶片卵形、披针形至长圆形,长 6—33 毫米,宽 3—8 毫米,先端钝或急尖,两面无毛,边缘具褐色卷曲长柔毛,叶柄长 1.7—2.5 厘米,边缘疏生褐色卷曲长柔毛;茎生叶,下部者具长 2—5.2 毫米之柄,上部者变无柄,叶片披针形、长圆形至狭长圆形,长 7—17 毫米,宽 2.3—6.5 毫米,腹面无毛,背面向下部和边缘具褐色卷曲柔毛。多歧聚伞花序长 1—7.5 厘米,(2—)8—24 花;花梗密被褐色卷曲长柔毛;萼片在花期由直立变开展至反曲,卵形、椭圆形至狭卵形,长 1.7—3.3 毫米,宽 1—2.2 毫米,先端钝,两面通常无毛,有时背面下部被褐色卷曲柔