

164. 青藏虎耳草(青藏高原药物图鉴)

Saxifraga przewalskii Engl. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. **29**:115. 1883; Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. **48**:580. f. 5E—H. 1912 et in Engl. Pflanzenr. **67**(IV. 117): 107. f. 21 E—H. 1916; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. **16**(2): 16. 1978; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 30. 1983; 西藏植物志 **2**: 483. 1985.

多年生草本,高4—11.5厘米,丛生。茎不分枝,具褐色卷曲柔毛。基生叶具柄,叶片卵形、椭圆形至长圆形,长15—25毫米,宽4—8毫米,腹面无毛,背面和边缘具褐色卷曲柔毛,叶柄长1—3厘米,基部扩大,边缘具褐色卷曲柔毛;茎生叶卵形至椭圆形,长1.5—2厘米,向上渐变小。聚伞花序伞房状,具2—6花;花梗长5—19毫米,密被褐色卷曲柔毛;萼片在花期反曲,卵形至狭卵形,长2.5—4.2毫米,宽1.5—2毫米,先端钝,两面无毛,边缘具褐色卷曲柔毛,3—5脉于先端不汇合;花瓣腹面淡黄色且其中下部具红色斑点,背面紫红色,卵形、狭卵形至近长圆形,长2.5—5.2毫米,宽1.5—2.1毫米,先端钝,基部具长0.5—1毫米之爪,3—5(—7)脉,具2疵体;雄蕊长2—3.6毫米,花丝钻形;子房半下位,周围具环状花盘,花柱长1—1.5毫米。花期7—8月。

产甘肃(祁连山地)、青海(黄南、海南、海北)和西藏(加查)。生于海拔3700—4250米的林下、高山草甸和高山碎石隙。模式标本采自甘肃、青海交界大通河以北山地。

165. 顶峰虎耳草(植物分类学报) 图版54:15—21

Saxifraga cacuminum H. Smith in Acta Hort. Gothob. **1**:13. 1924.

多年生草本,高4—5.5厘米,密丛生。茎被黑褐色腺毛。基生叶密集,具柄,叶片狭长圆状线形,长5—10毫米,宽0.9—1.1毫米,先端具芒,腹面和边缘具硬毛,背面无毛,叶柄长4—5毫米,基部扩大,边缘具长腺毛;茎生叶,下部者具柄,上部者变无柄,狭长圆状线形,长8—12毫米,宽1—1.2毫米,先端具芒,两面和边缘均生腺毛。花单生于茎顶;花梗长18—20毫米,被黑褐色腺毛;萼片在花期开展,三角状卵形,长3.3—3.7毫米,宽1.8—2毫米,腹面和边缘无毛,背面被腺毛,3脉于先端不汇合;花瓣黄色,长圆形,长6.1—6.2毫米,宽2—2.7毫米,先端急尖或稍钝,基部具长约0.5毫米之爪,3脉,具2疵体;雄蕊长约4.9毫米,花丝钻形;子房半下位,卵球形,长约4毫米,花柱长约2.5毫米,叉开。花期7—8月。

产四川西部。生于海拔4700—5200米的高山草甸。模式标本采自四川马尔康。

166. 狭瓣虎耳草(中国高等植物图鉴) 图版54:22—30

Saxifraga pseudohirculus Engl. in Bot. Jahrb. **48**: 590. 1912; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. **67** (IV. 117): 134. F. 30P—X. 1916; H. Smith in Acta Hort. Gothob. **1**: 12. 1924; 中国高等植物图鉴 **2**: 130. 图1990. 1972; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. **16**(2): 14. 1978; 西藏植物志 **2**: 490. 图161: 9—11. 1985. —*S. hirculoides* Engl. in Bull. Acad. Sci. St.-Petersb. **29**: 112. 1883, non Decne. 1835. —*S.*