

稍肉质,近狭卵形,长6—6.8毫米,宽2—2.5毫米,先端稍钝,两面无毛,边缘具腺睫毛;茎生叶稍肉质,近椭圆形,长约5.9毫米,宽约3.6毫米,先端钝,两面无毛,边缘具腺睫毛。花单生于茎顶;近无花梗;萼片在花期开展,稍肉质,阔卵形,长约2.5毫米,宽2—2.2毫米,先端钝,腹面无毛,背面和边缘具腺柔毛,3脉于先端汇合;花瓣黄色,倒阔卵形至椭圆形,长2.5—2.7毫米,宽1.8—2毫米,先端微凹,基部无爪,3脉,无疵体;雄蕊长约2.2毫米,花丝钻形;子房半下位,卵球形,花柱长约1毫米。蒴果椭圆形,长约4毫米。花果期7—9月。

产我国西藏(墨脱)。生于海拔3900—4200米的高山灌丛草甸。模式标本采自西藏墨脱(金珠拉山口)。

170. 光茎虎耳草(西藏植物志)

*Saxifraga glabricaulis* H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(9): 241. f. 7. t. 18A. 1960; 西藏植物志 2: 480. 1985. — *S. palpebrata* var. *elliptica* W. W. Smith in Rec. Bot. Surv. India 4: 368. 1913. — *S. palpebrata* var. *parceciliata* Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67 (IV. 117): 125. 1916.

多年生草本,高2—4厘米,密丛生。茎无毛。莲座叶披针状卵形,长4—6毫米,宽1.5—3毫米,先端钝,基部狭缩成细柄,腹面和边缘具粗毛;茎生叶之叶片近等长,倒披针形至狭倒卵形,长6—8毫米,宽2—3毫米,先端钝,腹面和边缘具粗毛,叶柄向上渐变短至无柄,其基部通常囊状膨大。花单生于茎顶;托杯无毛;萼片狭卵形至披针形,长3—4毫米,先端钝,无毛,3—6脉于先端汇合成1疣点;花瓣黄色,椭圆形至近圆形,长达8毫米,宽达5.5毫米,基部突然狭缩成长约1.5毫米之爪,5脉;在近似之雄花中,雄蕊长2—3.5毫米,花药长约0.8毫米,产生花粉,子房卵球状圆锥形,长约2毫米,花柱稍弯,长仅0.7毫米,柱头不明显,在近似之雌花中,雄蕊长约2.5毫米,花药缩小,缺少花粉,子房长约3毫米,周围具环状花盘,花柱长约1.5毫米,稍叉开,与柱头均粗壮。花果期7—9月。

产我国西藏东南部。生于海拔4800米的近积雪处。不丹、锡金、尼泊尔均有。模式标本采自不丹。

系5. 隐茎系——Ser. Jacquemontianae J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 29(1): 19. 1991.

系的模式种: 隐茎虎耳草 *Saxifraga jacquemontiana* Decne.

我国有1种。

171. 隐茎虎耳草(西藏植物志) 图版55: 16—24

*Saxifraga jacquemontiana* Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 68. t. 78. f. 2. 1835; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 395. 1878; Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenr. 67 (IV. 117): 156. 1916; Marquand in Journ. Soc. Bot. 48: 178. 1929;