

11, 1—n. 1958; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. 16(2): 16. 1978; Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nepal 2: 151. 1979; 中国高等植物图鉴补编 2: 35. 1983; 西藏植物志 2: 515. 1985.

多年生草本,小主轴极多分枝,叠结呈座垫状。花茎长约8毫米,被腺毛。小主轴之叶密集呈莲座状,稍肉质,长圆形至近匙形,长约5.5毫米,宽约2毫米,先端外弯,具5分泌钙质之窝孔,两面无毛,边缘(除先端外)具细齿状小睫毛,或无毛;茎生叶披针状长圆形,长约3.8毫米,宽约1毫米,先端急尖,无毛,具1窝孔,仅边缘(除先端外)具腺毛。花单生于茎顶;萼片直立,紫色,近披针形,长约3毫米,宽约1毫米,先端急尖,腹面无毛,背面和边缘(除先端外)疏生腺柔毛,3脉于先端不汇合;花瓣通常粉红色,倒卵形,长约5毫米,宽约3.3毫米,先端钝圆,基部渐狭成短爪,无疵体,5脉;雄蕊长约3.3毫米;子房半下位,花柱长约2.2毫米。花期6—8月。

产青海(囊谦、杂多)和西藏(拉萨)。生于海拔4200—4500米的高山碎石隙。尼泊尔、克什米尔地区及阿富汗均有。模式标本采自阿富汗。

173. 白瓣虎耳草(西藏植物志)

Saxifraga doyalana H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 118. f. 9k—m. 1958; 西藏植物志 2: 516. 1985.

多年生垫状草本;小主轴长达2厘米。花茎长约1厘米,被腺柔毛。小主轴之叶近倒卵形,长达4毫米,宽约2毫米,先端近钝,具5—7窝孔,上部增厚,不或稍外弯,两面无毛,中部以下边缘密生短小睫毛。单花生于茎顶;托杯外面被腺柔毛;萼片近阔卵形,长约1.8毫米,先端增厚,通常具窝孔,腹面无毛,背面和边缘(除先端外)密生腺柔毛(毛长达0.2毫米),3脉于先端不汇合;花瓣白色,倒阔卵形,长约6毫米,宽约4.2毫米,基部渐狭成长约1.5毫米之爪,具6脉;雄蕊长3—3.5毫米;2心皮下部合生;花柱2,长约1.5毫米。花期7—8月。

产我国西藏南部。生于海拔4800米左右的石隙。模式标本采自西藏(珠穆朗玛峰北坡)。

174. 九窝虎耳草(西藏植物志) 图版 55:25—27

Saxifraga kongboensis H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 113. f. 7a—d. 1958; 西藏植物志 2: 516. 1985.

多年生草本;小主轴极多分枝,长达7厘米。花茎长达2.5厘米,被腺柔毛。小主轴之叶密集,覆瓦状排列,呈莲座状,叶片肉质肥厚,近长圆形,长5—7(—10)毫米,宽1.5—1.9(—2.5)毫米,先端具短尖头,两面无毛,边缘下部具软骨质睫毛,具7—11分泌钙质之窝孔;茎生叶3—5,具1窝孔,腹面无毛,背面和边缘具腺柔毛。花单生于茎顶;托杯外面疏生腺柔毛;萼片在花期直立,卵形,长约3.5毫米,宽约2.5毫米,先端钝或近急尖,腹面无毛,背面和边缘(除先端外)具腺柔毛,4脉于先端不汇合,具分泌钙质之窝孔;花瓣黄