

至阔卵形，长2.1—4毫米，宽1.5—2.8毫米，先端通常钝，稀具短尖头，通常无毛，通常具3(稀1)分泌钙质之窝孔，腹面无毛，背面和边缘(先端除外)具腺毛，3—7脉于先端不汇合、半汇合至汇合(同时交错存在)；花瓣通常白色，稀淡黄色，倒卵形、倒阔卵形、椭圆形至近圆形，长3.3—9毫米，宽2.3—5毫米，先端钝圆，基部渐狭成长0.9—2毫米之爪，5—9脉，无痴体；雄蕊长1.1—6.2毫米；花盘环状；雌蕊长2—6.3毫米，子房半下位，花柱长1—2毫米。蒴果长约4毫米，2果瓣先端近水平状叉开。花果期5—9月。

产青海(囊谦)、四川(宝兴)、云南(中甸、丽江、洱源、维西)和西藏(八宿、错那、定结、吉隆)。生于海拔3 000—5 600米的林下、灌丛下和高山碎石隙。不丹也有。模式标本采自云南丽江。

180. 鄂西虎耳草(植物分类学报) 图版56:30—39

Saxifraga unguipetala Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. **48**: 610. 1912 et in Engl. Pflanzent. **69** (IV. 117): 571. f. 116 H. 1919. ——*S. saxatilis* H. Smith in Acta Hort. Gothob. **1**: 20. f. 5, 1—n. 1924. ——*S. kansuensis* Mattf. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin **10**: 887. 1930.


多年生草本，高约5厘米；小主轴反复分枝，叠结呈座垫状。花茎长3—3.7厘米，密被腺毛。小主轴之叶密集呈莲座状，肉质，近长圆状匙形，长7.3—9.5毫米，宽约2毫米，先端急尖，两面无毛，腹面稍凹陷，背面微弓凸，边缘中下部具软骨质睫毛，具羽状脉5—10，脉端具5—9分泌钙质之窝孔；茎生叶约7枚，狭长圆形至长圆状匙形，长4.6—5毫米，宽1—1.3毫米，先端急尖，腹面无毛或其下部被腺毛，背面基部被腺毛，边缘(除先端外)具腺睫毛，具1—5分泌钙质之窝孔。花单生于茎顶；花梗密被腺毛；萼片在花期直立，革质，阔卵形，长约3.2毫米，宽2.9—3毫米，先端急尖或稍渐尖，腹面无毛，背面和边缘具腺毛，8—9脉于先端不汇合或半汇合，中肋末端具1窝孔；花瓣白色，椭圆形、倒卵形至倒阔卵形，长6—6.5毫米，宽3.3—3.5毫米，先端钝圆，基部渐狭成短爪，6—9脉；雄蕊长约3.5毫米，花丝钻形；花盘不明显；子房半下位，阔卵球形，长约3毫米，花柱长约2.1毫米。花期7—8月。

产甘肃(岷山)、湖北西部、四川北部。生于海拔3 200—4 300米的岩壁石隙。模式标本采自湖北西部。

181. 短瓣虎耳草(植物分类学报) 图版57:1—6

Saxifraga andersonii Engl. in Engl. et Prantl, Nat. pflanzenfam. **3**(2a): 59. 1890, nom. nud.; Engl. et Irmsch. in Bot. Jahrb. **48**: 609. 1912, err. ut "anderlo-nii" et in Engl. Pflanzenr. **69** (IV. 117): 570. f. 116E. 1919; J. T. Pan in Acta Phytotax. Sin. **16**(2): 16. 1978; Hara et williams, Enum. Flow. pl. Nepal **2**: 151. 1979, p. p.; 西藏植物志 **2**: 512. 1985.

多年生草本，高2.5—9厘米；小主轴极多分枝，叠结成座垫状。花茎具4—5叶，在花



1—6. 截叶虎耳草 *Saxifraga clivorum* H. Smith: 1.一枝, 2.小主轴之叶腹面和背面, 3.茎生叶腹面和背面, 4.萼片, 5.花瓣, 6.示花梗、苞片、雄蕊和雌蕊。7—16. 美丽虎耳草 *Saxifraga pulchra* Engl. et Irmach.: 7.全株, 8.小主轴之叶腹面, 9.小主轴之叶背面, 10.茎生叶腹面, 11.茎生叶背面, 12.苞片, 13.萼片腹面, 14.萼片背面, 15.花瓣, 16.示花梗、苞片、雄蕊和雌蕊。17—23. 单翼虎耳草 *Saxifraga subsessiliflora* Engl. et Irmach.: 17.一枝, 18.小主轴下部叶, 19.小主轴上部叶, 20.花, 21.萼片, 22.花瓣, 23.示苞片、雄蕊和雌蕊。24—29. 丽江虎耳草 *Saxifraga likiangensis* Franch.: 24.一枝, 25.小主轴之叶, 26.茎生叶, 27.萼片腹面和背面, 28.花瓣, 29.示花梗、苞片、雄蕊和雌蕊。30—39. 鄂西虎耳草 *Saxifraga unguipedala* Engl. et Irmach.: 30.全株, 31—32.小主轴之叶腹面, 33.小主轴之叶侧面, 34—35.茎生叶腹面, 36.萼片腹面, 37.萼片背面, 38.花瓣, 39.示花梗、花丝和雌蕊。(潘锦堂、刘进军绘)