

7—9 脉,无痂体;雄蕊长 1.8—4 毫米;雌蕊长约 5.5 毫米,2 心皮下部合生,上部分离且稍叉开。花期 7—8 月。

产我国西藏(墨脱)。生于海拔 3 900 米左右。模式标本采自西藏墨脱。

185. 挪威虎耳草(植物分类学报) 图版 57: 33—38

Saxifraga oppositifolia L. Sp. Pl. ed. 1, 1: 402. 1753; D. Don in Trans. Linn. Soc. 13: 400. 1821; Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 62. 1857; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 397. 1978; Engl. et Irmsch. in Engl. pflanzenr. 69(IV. 117): 616. 1919; A. Los. in Kom. Fl. URSS 9: 197. 1939. — *S. oppositifolia* L. subsp. *asiatica*(Hayek) Engl. et Irmsch. op. cit. 640.

多年生草本,高约 6 厘米,小主轴多分枝。花茎疏被褐色柔毛。小主轴之叶交互对生,覆瓦状排列,密集呈莲座状,叶腋具芽,稍肉质,近倒卵形,长 3.5—4 毫米,宽 1.6—2.3 毫米,先端钝,具 1 分泌钙质之窝孔,两面无毛,边缘具柔毛;茎生叶对生,较疏,稍肉质,近倒卵形,长 4.2—4.5 毫米,宽 2.6—2.9 毫米,先端钝,具 1 分泌钙质之窝孔,两面无毛,边缘具柔毛。花单生于茎顶;花梗长约 3 毫米,疏生褐色柔毛;萼片在花期直立,革质,卵形至椭圆状卵形,长 4.9—5 毫米,宽 2.9—3 毫米,先端钝,两面无毛,边缘具柔毛,6—7 脉于先端半汇合至汇合;花瓣紫色,狭倒卵状匙形,长约 12 毫米,宽 5—5.1 毫米,先端微凹,基部渐狭成长约 3.5 毫米之爪,约具 7 脉;雄蕊长约 7 毫米,花丝钻形;花盘不明显;子房近球形,长约 2.7 毫米,花柱长约 6.5 毫米。染色体 $2n = 26$ 。花期 7—8 月。

产新疆(托木尔峰)和西藏西部。生于海拔 3 900—5 600 米的高山石隙。蒙古、苏联、欧洲、克什米尔地区和北美均有。模式标本采自挪威(斯匹次卑尔根群岛)。

186. 四数花虎耳草(西藏植物志)

Saxifraga monantha H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 94. f. 2a—d. 1958; 西藏植物志 2: 509. 1985.

多年生疏丛草本,高 2—7 厘米;小主轴极多分枝。花茎细弱,长达 1.5 厘米,被腺柔毛。小主轴之叶对生,覆瓦状排列,倒卵状椭圆形,长约 5 毫米,宽 2.5—3.7 毫米,先端近急尖或稍钝,基部合生且半抱茎,无毛,具 3—7 窝孔;茎生叶 4 枚,对生,线形,长 2.2—3 毫米,先端钝,基部不合生,腹面无毛,背面下部和边缘中部以下具腺柔毛,仅具 1 窝孔。花单生于茎顶,四数;托杯外面被短腺毛;萼片阔卵形,长约 2 毫米,宽 2—2.2 毫米,先端钝而无毛,腹面无毛,背面和边缘(先端除外)具腺毛,3 脉于先端不汇合或汇合成 1 小疣点;花瓣白色,倒卵形,长约 6.5 毫米,宽 4—4.5 毫米,先端钝,基部渐狭成不明显之爪,约具 11 脉;2 心皮下部合生,分离部长约 3 毫米,子房半下位。花期 5—8 月。

产我国西藏(朗县)。生于海拔 3 900 米左右的潮湿岩石上。模式标本采自西藏朗县。

187. 索白拉虎耳草(西藏植物志)

Saxifraga elliotii H. Smith in Bull. Brit. Mus. Bot. 2(4): 109. f. 6h—j. 1958;